

Size: 180x47 mm

Minimum font size of the information on the Mock up is 7pt.



Black

Obavijest za liječnike:

- Apiksaban Grindeks (apiksaban) je peroralni antikoagulans koji djeluje kao direktni selektivni inhibitor faktora Xa.
- Apiksaban Grindeks može povećati rizik od krvarenja. Ukoliko dođe do većeg krvarenja, ono se mora odmah zaustaviti.
- Liječenje lijekom Apiksaban Grindeks ne zahtjeva rutinsko praćenje izloženosti. U iznimnim okolnostima (npr. predožiranje i hitni kirurški zahvat) može koristiti kalibrirani kvantitativni dokaz faktora Xa, dok se INR vrijednosti ili aktivirano djelomično tromboplastinsko vrijeme (en. activated partial thromboplastin time-aPTT) ne preporučuju (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka).
Postoji agens koji utječe na reaktiviranje faktora Xa kod odraslih, međutim njegova djelotvornost i sigurnost nisu ispitane u pedijatrijskih bolesnika (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka andeksanet alfa).

Apiksaban Grindeks
(apiksaban)

Grindex

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Kartica mora u svakom trenutku biti uz Vas/dijete/njegovatelja

Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja.

Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji lijekom Apiksaban Grindeks (apiksaban) za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka.

HR1.0

Molimo ispunite slijedeći odjeljak ili zamolite liječnika da to učini.

Ime i prezime:
Datum rođenja:
Indikacija:
Tjelesna težina:
Doza: mg 2 puta dnevno
Ime i prezime liječnika:
Broj telefona liječnika:

Obavijest za bolesnike/njegovatelje

- Apiksaban Grindeks morate uzeti/davati redovito, kako je liječnik propisao. Ukoliko propustite uzeti/dati jutarnju dozu, trebate je uzeti/dati čim se sjetite, a najkasnije se može uzeti/dati zajedno s večernjom dozom. Propuštena večernja doza se može uzeti/dati samo tijekom iste večeri. Nemojte uzeti/dati dvije doze slijedeće jutro, nego umjesto toga slijedite uobičajeni raspored dva puta dnevno za slijedeći dan.
- Ne smijete prestati uzimati/davati Apiksaban Grindeks bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer ste/bolesnik je izložen riziku od moždanog udara/ stvaranja krvnih ugrušaka ili drugih komplikacija.
- Apiksaban Grindeks pomaže u razrjeđivanju krvi. Međutim, to može povećati rizik od krvarenja.
- Znakovi i simptomi krvarenja uključuju stvaranje modrica i potkožno krvarenje, stolicu boje katrana, krv u mokraći, krvarenje iz nosa, omaglicu, umor, bljedilo ili slabost, naglu glavobolju, iskašljavanje ili povraćanje krvi.
- Ukoliko krvarenje ne prestane spontano, **odmah potražite medicinsku pomoć.**
- Ukoliko Vi/bolesnik treba(te) operativni ili drugi invazivni zahvat, obavijestite liječnika da uzimate/bolesnik prima Apiksaban Grindeks.

09/2025