

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

[Bevimir tablete 2,5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg]

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Bevimir 2,5 mg

Bevimir 10 mg

Bevimir 15 mg

Bevimir 20 mg

- ◆ Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku
- ◆ Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja

1366041 HR

**Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji
lijekom Bevimir (rivaroksaban)**

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Tjelesna težina:

Drugi lijekovi/stanja:

U hitnom slučaju molim obavijestite:

Ime i prezime liječnika:



Broj telefona liječnika:

Faksimil liječnika:

Molim također obavijestite:

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

Obavijest za zdravstvene radnike:

- ◆ INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Bevimir.

Što trebam znati o lijeku Bevimir?

- ◆ Bevimir razrjeđuje krv i i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka
- ◆ Bevimir morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka.**
- ◆ Ne smijete prestati uzimati Bevimir bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- ◆ Obavijestite svog zdravstvenog radnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati Bevimir
- ◆ Obavijestite zdravstvenog radnika da uzimate lijek Bevimir prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

Kada trebam potražiti savjet liječnika?

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Bevimir, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinjite uzimati Bevimir bez prethodnog dogovora s liječnikom ako znate da ste izloženi povećanom riziku od krvarenja. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- ◆ bol
- ◆ oticanje ili nelagodu
- ◆ glavobolju, omaglicu ili slabost
- ◆ neobično stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu kvariti
- ◆ menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- ◆ krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvenu ili crnu stolicu
- ◆ iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

Kako uzimati Bevimir?

- ◆ Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Bevimir:
 - od 2,5 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
 - od 10 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
 - od 15 mg se mora uzimati s hranom
 - od 20 mg se mora uzimati s hranom

