

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Ribas 2,5 mg

Ribas 10 mg

Ribas 15 mg

Ribas 20 mg

- Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku
- Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja



Ja sam na antikoagulacijskoj terapiji lijekom Ribas (rivaroksaban)

Ime i prezime: _____

Adresa: _____

Datum rođenja: _____

Tjelesna težina: _____

Drugi lijekovi / stanja: _____

U hitnom slučaju molim obavijestite:

Ime i prezime liječnika: _____

Broj telefona liječnika: _____

Faksimil liječnika: _____

Molim također obavijestite:

Ime i prezime: _____

Broj telefona: _____

Srodstvo: _____

Obavijest za liječnike:

- INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulacijske aktivnosti lijeka Ribas.

Što trebam znati o lijeku Ribas?

- Ribas razrjeđuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- Ribas morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka**.
- Ne smijete prestati uzimati Ribas bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- Obavijestite svog liječnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati Ribas.
- Obavijestite liječnika da uzimate lijek Ribas prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

Kada trebam potražiti savjet liječnika?

Prilikom uzimanja antikoagulacijskih lijekova kao što je Ribas, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinjite uzimati Ribas bez prethodnog dogovora s liječnikom ako znate da ste izloženi povećanom riziku od krvarenja.

Odmah obavijestite svog liječnika ako imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- bol
- oticanje ili nelagodu
- glavobolju, omaglicu ili slabost
- neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu krvariti
- menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego ubičajeno
- krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvena ili crna stolica
- iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave

Kako uzimati Ribas?

- Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Ribas
 - od 2,5 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
 - od 10 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
 - od 15 mg se mora uzimati s hranom
 - od 20 mg se mora uzimati s hranom