

## KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

### Kartica s upozorenjima za bolesnika

**Runaplast 10 mg**

**Runaplast 15 mg**

**Runaplast 20 mg**

- ♦ **Imajte ovu karticu uz sebe u svakom trenutku**
- ♦ **Pokažite ovu karticu svakom liječniku ili stomatologu prije liječenja**

#### **Ja sam na antikoagulantnoj terapiji lijekom Runaplast**

Ime i prezime:

Adresa:

Datum rođenja:

Krvna grupa:

Tjelesna težina:

Drugi lijekovi / stanja:

#### **U hitnom slučaju molim obavijestite:**

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Faksimil liječnika:

#### **Molim također obavijestite:**

Ime i prezime:

Broj telefona:

Srodstvo:

#### **Obavijest za liječnike:**

- ♦ INR vrijednosti se ne bi smjele koristiti jer nisu pouzdana mjera antikoagulantne aktivnosti lijeka Runaplast.

#### **Što trebam znati o lijeku Runaplast?**

- ♦ Runaplast razrjeđuje krv i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka.
- ♦ Runaplast morate uzimati točno prema uputama liječnika. Kako bi osigurali optimalnu zaštitu od stvaranja krvnih ugrušaka, **nikad nemojte propustiti dozu lijeka.**
- ♦ Ne smijete prestati uzimati Runaplast bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer se tako može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
- ♦ Obavijestite svog liječnika ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove, ili ste ih nedavno uzimali ili ih namjeravate početi uzimati, prije nego počnete uzimati Runaplast.
- ♦ Obavijestite liječnika da uzimate lijek Runaplast prije bilo kakve operacije ili invazivnog postupka.

#### **Kada trebam potražiti savjet liječnika?**

Prilikom uzimanja antikoagulantnih lijekova kao što je Runaplast, važno je biti svjestan mogućih nuspojava. Krvarenje je najčešća nuspojava. Ne započinjite uzimati Runaplast bez prethodnog dogovora s liječnikom ukoliko znate da ste izloženi povećanom riziku od

krvarenja. Odmah obavijestite svog liječnika ukoliko imate neki od znakova ili simptoma krvarenja poput sljedećih:

- ◆ bol
- ◆ oticanje ili nelagodu
- ◆ glavobolju, omaglicu ili slabost
- ◆ neobično stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni, rane kojima treba dugo da prestanu kvariti
- ◆ menstrualno ili vaginalno krvarenje obilnije nego uobičajeno
- ◆ krv u mokraći koja može biti ružičasta ili smeđa, crvena ili crna stolica
- ◆ iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave.

#### **Kako uzimati Runaplast?**

- ◆ Kako bi se osigurala optimalna zaštita, Runaplast
- od 10 mg može se uzimati s hranom ili bez nje
- od 15 mg se mora uzimati s hranom
- od 20 mg se mora uzimati s hranom.