

BEKEMV▼(ekulizumab) KARTICA SA SIGURNOSNIM INFORMACIJAMA ZA BOLESNIKA

► Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.



Važne sigurnosne informacije za bolesnike koji uzimaju BEKEMV
Pokažite ovu karticu svakom liječniku koji je uključen u Vašu zdravstvenu skrb.

BEKEMV može smanjiti učinkovitost Vašeg imunološkog sustava u borbi protiv infekcije. Mogu se razviti ozbiljne infekcije, uključujući sepsu, **osobito meningokokne infekcije** koje zahtijevaju hitnu medicinsku skrb. Ako imate bilo koji od sljedećih simptoma morate odmah obavijestiti Vašeg liječnika.

Ako vam liječnik nije dostupan potražite hitnu medicinsku skrb u centru za hitnu medicinsku skrb i pokažite im ovu karticu.

- Glavobolja s mučinom i povraćanjem
- Glavobolja sa ukočenim vratom ili ledima
- Vrućica (povišena temperatura)
- Osip
- Zbunjenost
- Bolovi u mišićima sa simptomima nalik gripi
- Osjetljivost očiju na svjetlost



Odmah potražite hitnu medicinsku skrb ako imate bilo koji od navedenih znakova ili simptoma i pokažite ovu karticu.

Čak i ako prestanete uzimati BEKEMV, zadržite ovu karticu tri mjeseca nakon uzimanja posljednje doze lijeka BEKEMV. Rizik od menigokokne infekcije može postojati još dugo vremena nakon posljednje doze lijeka.

Ako Vi (ili Vaše dijete) imate(ima) naslijedno nepodnošenje fruktoze, rijetki genetski poremećaj, Vi (ili Vaše dijete) ne smijete(smije) primiti ovaj lijek. Bolesnici s naslijednim nepodnošenjem fruktoze ne mogu razgraditi fruktozu sadržanu u ovom lijeku, što može uzrokovati ozbiljne nuspojave, kao što su napadaji, koma, zastoj u razvoju (kod djece), zatajenje bubrega i jetre.

KARTICA SA SIGURNOSnim INFORMACIJAMA ZA BOLESNIKA



Informacije za liječnika koji obavlja liječenje



Ovom je bolesniku propisana terapija lijekom BEKEMV (ekulizumab), kojom se povećava sklonost bolesnika meningokoknoj infekciji (*Weisseria meningitidis*) ili drugim općim infekcijama.

- Meningokokne infekcije mogu vrlo brzo postati opasne po životili smrtonosne ako se rano ne prepoznaju i liječe.
- Odmah procijenite sumnju na infekciju i po potrebi liječite odgovarajućim antibioticima
- BEKEMV je kontraindiciran u bolesnika s naslijednim nepodnošenjem fruktoze (bez obzira na dob) i u djece mlađe od dvije godine kojima još nije dijagnosticirano naslijedno nepodnošenje fruktoze.
- Nakon intravenske primjene lijekova koji sadrže sorbitol kao što je BEKEMV, bolesnici s naslijednim nepodnošenjem fruktoze mogu razviti hipoglikemiju, metaboličku acidozu, napadaje, komu i mogu biti životno ugroženi. Odmah procijenite ako se sumnja na naslijedno nepodnošenje fruktoze i liječite ga na odgovarajući način.
- Čim prije se obratite liječniku koji propisuje terapiju (u nastavku)
- Više informacija o lijeku BEKEMV potražite u potpunom sažetku opisa svojstava lijeka ili e-poštom na: eu-si-medinfo@amgen.com.

► Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.



Bolesnici koji uzimaju lijek BEKEMV moraju uvijek nositi ovu karticu

Ime i prezime bolesnika _____

Bolnica u kojoj je bolesnik liječen _____

Ime i prezime liječnika _____

Br. telefona _____

Datum cijepljenja protiv meningokokova _____