

Namuscla

(meksiletin)

Kartica upozorenja za bolesnika

Karticu pročitajte zajedno s Uputom o lijeku

Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Namuscla u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovoga lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Zašto sam dobio/la ovu karticu?

Lijek Namuscla sadrži meksiletin i neki bolesnici koji uzimaju meksiletin mogu razviti srčanu aritmiju (nepravilne otkucaje srca) koja **može biti opasna po život**.

Što trebam učiniti s ovom karticom?

- Ovu karticu trebate stalno nositi sa sobom – stavite je, na primjer, u svoj novčanik ili torbicu.
- Obavijestite svog liječnika/medicinsku sestru/farmaceuta o lijekovima koje trenutno uzimate i pokažite im ovu karticu prije nego što počnete uzimati bilo koji novi lijek dok se liječite lijekom Namuscla.

Koji su znakovi srčane aritmije?

Tipični znakovi i simptomi srčane aritmije su:

- osjećaj da Vam srce kuca previše snažno ili prebrzo (palpitacije)
- bol u prsima
- neobična glavobolja
- znojenje
- kratkoća daha
- osjećaj slabosti, vrtoglavica ili nesvjestica

**Odmah kontaktirajte hitnu pomoć ako
iskusite bilo koji od ovih znakova!**

Ispunite sljedeće podatke:

Datum početka uzimanja lijeka Namuscla:

.....

Vaše ime i prezime:

.....

Liječnikovo ime i prezime:

.....

Liječnikov telefonski broj:

.....

Što još moram znati?

Prije početka liječenja lijekom Namuscla i redovito tijekom liječenja, bit ćete podvrgnuti testovima za procjenu funkcije srca, uključujući elektrokardiogram (EKG). Ovisno o funkciji Vašeg srca, možda ćete trebati testiranje prije i nakon bilo kakve promjene doze. Slijedite sve upute koje Vam daje Vaš liječnik.

Nemojte uzeti više od 3 kapsule lijeka Namuscla dnevno.

Nemojte uzeti duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Za više informacija pogledajte Uputu o lijeku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED mobilnu aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.