

Zdravstvena ustanova:

Ime liječnika koji je propisao lijek:

Telefonski broj liječnika koji je propisao lijek:

Da biste saznali više informacija o lijeku Filspari, pažljivo pročitajte uputu o lijeku s informacijama za bolesnike. Ako imate bilo kakvih pitanja o liječenju, obratite se svom liječniku.

Vitor France

XXXXXXXX-01

Kartica za bolesnika - Filspari®

Važno sigurnosno upozorenje za bolesnike koji uzimaju Filspari

Ova kartica sadrži važne sigurnosne informacije koje morate imati na umu tijekom liječenja lijekom Filspari. Uvijek imajte ovu karticu sa sobom i pokažite je svakom liječniku koji Vas liječi.

Ako zatrudnite ili mislite da biste mogli biti trudni dok uzimate Filspari ili ubrzo nakon prestanka uzimanja lijeka Filspari (do mjesec dana), ili ako primijetite znakove da Vam jetra ne radi pravilno, odmah se obratite svom liječniku.

Trudnoća

Nemojte uzimati Filspari ako ste trudni ili planirate trudnoću. Filspari može naškoditi nerođenom djetetu.

Kontracepcija

Ako postoji mogućnost da zatrudnite, koristite pouzdanu metodu sprječavanja trudnoće (kontracepciju) dok uzimate Filspari i još mjesec dana nakon prestanka liječenja. Posavjetujte se o tome sa svojim liječnikom.

Test na trudnoću

Ako ste žena koja može zatrudnjeti, liječnik će od Vas zatražiti da napravite test na trudnoću prije nego što počnete uzimati Filspari.

Praćenje funkcije jetre

Liječnik će prije početka liječenja i u redovitim razmacima tijekom liječenja provjeriti radi li Vam jetra pravilno i po potrebi prekinuti primjenu lijeka Filspari. Važno je da te pretrage obavite prema uputama liječnika.

Znakovi da Vam jetra možda ne radi pravilno: mučnina (nagon na povraćanje), povraćanje, vrućica (visoka temperatura), bol u želucu (abdomenu), žutica (žutilo kože ili bjeloočnica), mokraća tamne boje, svrbež kože, letargija ili umor (neuobičajen umor ili iscrpljenost), simptomi slični gripí (bol u zglobovima i mišićima s vrućicom).

Ako primijetite bilo koji od tih znakova, odmah obavijestite svog liječnika.