

Voziberin (apiksaban)

Kartica za bolesnika

Ova kartica uvijek treba biti uz Vas/dijete/njegovatelja.

Pokažite ovu karticu svom ljekarniku, stomatologu ili drugom zdravstvenom radniku prije liječenja.

Liječim se antikoagulacijskim lijekom Voziberin (apiksaban) koji sprječava zgrušavanje krvi.

Molimo Vas ispunite ovaj dio ili zamolite svog liječnika da ga ispuni:

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Indikacija:

Tjelesna težina:

Doza: mg dvaput na dan

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Informacije za bolesnike/njegovatelje

- Voziberin uzimajte/dajte redovito, prema uputama. Ako propustite jutarnju dozu, uzmite/dajte je čim se sjetite ili zajedno s večernjom dozom. Propuštena večernja doza može se uzeti/dati samo tijekom iste večeri. Ne smijete uzeti/dati dvije doze sljedeće jutro, već sljedeći dan trebate nastaviti prema uobičajenom rasporedu uzimanja dvaput na dan, kako je preporučeno.
- Nemojte prestati uzimati/davati Voziberin bez razgovora s liječnikom s obzirom na to da imate / bolesnik ima rizik od pojave moždanog udara / krvnog ugruška ili drugih komplikacija.
- Voziberin Vam pomaže razrijediti krv. Međutim, to može povisiti rizik od krvarenja.
- Znakovi i simptomi krvarenja uključuju stvaranje modrica ili krvarenje ispod kože, crno obojenu stolicu, krv u mokraći, krvarenje iz nosa, omaglicu, umor, bljedilo ili slabost, iznenadnu tešku glavobolju, iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi.
- Ako krvarenje ne prestane samo od sebe, **odmah zatražite medicinsku pomoć.**
- Ako idete / bolesnik ide na operaciju ili bilo kakav invazivni postupak, obavijestite liječnika da uzimate / bolesnik uzima Voziberin.

Informacije za zdravstvene radnike

- Voziberin (apiksaban) je oralni antikoagulans koji djeluje izravnom selektivnom inhibicijom faktora Xa.
- Voziberin može povećati rizik od krvarenja. U slučajevima jakih krvarenja potrebno je odmah prekinuti primjenu.
- Liječenje lijekom Voziberin ne zahtijeva rutinsko praćenje izloženosti. Kalibrirano kvantitativno određivanje sadržaja antifaktora Xa može biti korisno u iznimnim

situacijama, primjerice kod predoziranja i hitnih operacija (testovi zgrušavanja protrombinsko vrijeme (PV), međunarodni normalizirani omjer (INR) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) se ne preporučuju) – vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka.

- Dostupan je lijek za reverziju aktivnosti antifaktora Xa apiksabana za odrasle osobe. Međutim, njegova sigurnost i djelotvornost nisu ustanovljene u pedijatrijskih bolesnika (pročitajte sažetak opisa svojstava lijeka za andeksanet alfa).