

Podsjetnik
za bolesnika

Ime liječnika:

Broj telefona:

Bilješke:

Tablica
termina
pregleda

U ovu tablicu
bilježite datume
dogovorenih
liječničkih pregleda:

Datum pregleda	Korištena kontracepcija	Nalaz testa na trudnoću ☐ Pozitivan ☐ Negativan Datum:	Potpis liječnika
		☐ Pozitivan ☐ Negativan Datum:	
		☐ Pozitivan ☐ Negativan Datum:	
		☐ Pozitivan ☐ Negativan Datum:	
		☐ Pozitivan ☐ Negativan Datum:	
		☐ Pozitivan ☐ Negativan Datum:	
		☐ Pozitivan ☐ Negativan Datum:	
		☐ Pozitivan ☐ Negativan Datum:	
		☐ Pozitivan ☐ Negativan Datum:	

Kartica za korisnika
lijeka koji sadrži retinoid
(acitretin ili izotretinoin)

Ovaj je lijek propisan samo Vama, nemojte ga dijeliti s drugima, a sve neupotrijebljene kapsule vratite u ljekarnu.

Informacije navedene u ovoj kartici ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju lijeka koji sadrži acitretin ili izotretinoin. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

verzija 3; svibanj, 2024.

	Što morate učiniti ako biste mogli zatrudnjeti:	Prijavljivanje nuspojava
Lijekovi koji sadrže acitretin ili izotretinoin se ne smiju uzimati tijekom trudnoće jer mogu ozbiljno naškoditi nerođenu djetetu. Ako zatrudnite ili mislite da biste mogli biti trudni, odmah prestanite uzimati i obratite se svom liječniku.	! Morate koristiti najmanje 1 visoko učinkovitu metodu kontracepcije (npr. maternični uložak ili usadak) ili pravilno koristiti 2 učinkovite metode kontracepcije (npr. oralni kontraceptiv u kombinaciji s prezervativom) prije početka liječenja, za vrijeme liječenja i mjesec dana nakon njegova završetka. ! Ne smijete zatrudnjeti: ■ tijekom uzimanja lijeka koji sadrži acitretin ili izotretinoin ■ niti unutar mjesec dana nakon prestanka uzimanja	! Morate redovito odlaziti na kontrolne preglede i provoditi testove trudnoću: ■ Prije početka liječenja morate napraviti test na trudnoću, čiji nalaz mora biti negativan. ■ Kako biste bili sigurni da niste trudni tijekom liječenja, morate redovito provoditi testove na trudnoću, po mogućnosti svakog mjeseca. Zadnji test na trudnoću morate napraviti mjesec dana nakon završetka liječenja. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.