

Liječnici: Vidjeti sažetak opisa svojstava liječka LEMTRADA za više informacija.

hepatitis, HLV i stegena hemofilija, TR, AOSD i autolumini encfaliti

• odgođenih nuspojava: poremećaj štitnjake, TR, poremećaj bubrega, autolumini

mozaka, krvarenje u plućima i tromboocitopenija

LEMTRADA: strani udar, moždani udar, puknuta krvnim žilama koje okskrbljuju

• ozbiljnih nuspojava koje se obično javljaju unutar 1-3 dana nakon intuzije liječka

• ozbiljnih infekcija

Liječnici: Liječkom LEMTRADA može povući rizik od:

najmanje 48 mjeseci nakon posljednje doze liječka.

na imunološki sustav. Sudjelujem u posebnom programu prageneja, koji se provodi

Liječenja sam liječkom LEMTRADA, liječkom za multipe sklerozu (MS) koji utječe

djelatnicima hitem pomoci kako biste ih obavijestili da se liječite liječkom LEMTRADA.

Uvijek nosite ovu karticu sa sobom i pokazite ju svim zdravstvenim radnicima!

Upute za pružanje dostupne su na www.hamed.hr.

sigurnosnih informacija. Pravovom svih sumnji na nuspojavu i vi možete pomoci.

▲ Ova je liječek pod dodatnim praviljem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih

KARTICA S UPORERNJIMA ZA BOLJESNIKA koji koristi liječek LEMTRADA (alemtuzumab)

Liječnik neurolog koji mi je propisao liječek LEMTRADA dostupan je na dolje navedenom broju telefona ili adresi elektroničke pošte. U nastavku mogu biti navedeni i drugi liječnici ili zdravstveni djelatnici koji sudjeluju u mome liječenju.

Ako se provode bilo kakve pretrage, molimo Vas da kopiju cijelokupne medicinske dokumentacije, uključujući svu terapiju i/ili nalaze pretraga, dostavite liječniku/liječnicima i medicinskoj sestri/medicinskim sestrama navedenim u nastavku.

Ime i prezime bolesnika:

Potpis bolesnika:

Datum posljednje infuzije liječka LEMTRADA:

	Ime i prezime	Broj telefona	E-mail
Neurolog			
Liječnik obiteljske medicine			
Medicinska sestra zadužena za MS			

Verzija 5, listopad, 2022.

LEMT
RAD
A
DA

simptoma.
liječenja liječkom
posljednjeg ciklusa
nastaviti prati
Također, morate
mjeseci nakon
činiti to još 48

priliku za oporavak.
Vam dati najbolju
diagnозu mogu
Rano otkrivanje i



Odgodene nuspojave se mogu pojaviti i nakon 48 mjeseci. Stoga morate
nastaviti paziti na znakove i simptome, čak i nakon što više nećete morati
obavljati mjesечne pretrage.

Vrlo je važno da svakoga mjeseca nastavite obavljati pretrage namjane 48
mjeseci (4 godine) nakon posljednje infuzije (čak i ako se osjećate dobro).

Što morate znati o lijeku LEMTRADA (alemtuzumab)

Odmah nazovite neurologa kako biste prijavili dolje navedene simptome bez obzira jesu li novi, pogoršavaju se ili se ponovno javljaju. Ako Vaš liječnik nije dostupan, odmah zatražite medicinsku pomoć i pokažite osobljju ovu karticu.

VAŽNE NUSPOJAVE NA KOJE TREBA OBRATITI PAŽNJU:

Ozbiljne infekcije

- vrućica, zimica, umor, kratkoća daha, kašalj, zviždanje pri disanju, bol ili stezanje u prsnom košu, iskašljavanje krvi

Rijetka infekcija mozga koja se zove progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML)

- progresivna slabost ili nespretnost udova,
- smetnje vida, poteškoće u govoru ili
- promjene u razmišljanju, pamćenju i orijentaciji što dovodi do konfuzije i promjena osobnosti

Ozbiljne nuspojave koje se mogu javiti ubrzo nakon infuzije lijeka LEMTRADA

(nuspojave se obično javljaju unutar 1-3 dana nakon infuzije)

Srčani udar

- bol ili nelagoda u prsištu, kratkoća daha, bol ili nelagoda u rukama, vilici, vratu, ledima ili trbuhi
- osjećaj vrtoglavice ili nesvjestice, mučnina, znojenje

Moždani udar i paknuća u krvnim žilama koje opskrbljuju mozak

- iznenadno opuštanje dijelova lica, slabost na jednoj strani, poteškoće s govorom
- iznenadna jaka glavobolja, bolovi u vratu

Krvarenje u plućima

- kratkoća daha, bol ili nelagoda u prsištu, iskašljavanje krvi

Trombocitopenija

- olakšano stvaranje modrica i/ili krvarenje

Odgodene nuspojave

(mogu se javiti nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon infuzije)

Poremećaji štitnjače

Hipertireoza

- pretjerano znojenje, neobjašnjivi gubitak tjelesne težine, oticanje očiju, nervozna, ubrzani otkucaji srca

Hipotireoza

- osjećaj hladnoće, neobjašnjivo povećanje tjelesne težine, pojačan osjećaj umora, novonastali zatvor

Imuna trombocitopenijska purpura (ITP)

- male, raspršene, crvene, ružičaste ili ljubičaste točkice na koži, spontano ili lako stvaranje modrica, krvarenje iz posjekotine koje se zaustavlja teže nego obično; obilnije, dulje ili češće mjesecnice nego obično;
- krvarenje iz desni ili nosa koje je novonastalo ili treba dulje nego obično da se zaustavi, iskašljavanje krvi
- bolni ili otečeni zglobovi

Poremećaji bubrega, uključujući bolest s protutijelima na glomerularnu bazalnu membranu (anti-GBM bolest)

- krv u mokraći – mokraća može biti crvena ili boje čaja [smedjal], oticanje nogu ili stopala, iskašljavanje krvi

Autoimuni hepatitis

- neobjašnjiva mučnina, povraćanje, umor, bol u trbuhi, gubitak apetita, oticanje trbuha
- žuta boja kože i očiju i/ili tamna mokraća, krvarenje ili stvaranje modrica lakše nego obično

Hemofagocitna limfohistiocitoza (HLH)

- neobjašnjiva vrućica s visokom temperaturom, teška glavobolja, ukočen vrat, povećanje limfnih čvorova, žuta boja kože, osip na koži

Stečena hemofilija A

- krvarenje iz posjekotine koje se zaustavlja teže nego obično
- spontano stvaranje modrica, krvarenje iz nosa, bolni ili otečeni zglobovi

Trombotična trombocitopenijska purpura (TTP)

- modrice ispod kože ili u ustima, koje mogu izgledati kao male crvene točkice, uz ili bez prisustva neobjašnjivog ekstremnog umora, vrućica, zbumjenost, promjene u govoru, žuta boja kože i očiju (žutica), smanjena količina mokraće, tamno obojana mokraća

Stillova bolest odrasle dobi (engl. AOSD)

- vrućica >39°C koja traje više od 1 tjedna, bol, ukočenost sa ili bez oticanja u više zglobova i/ili osip na koži

Autoimuni encefalitis

- promjene u ponašanju i/ili psihijatrijske promjene, poremećaji kretanja, kratkotrajni gubitak pamćenja ili napadaji kao i drugi simptomi koji mogu nalikovati recidivu multiple skleroze