

## **Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika**

**Etoxib 30 mg filmom obložene tablete  
Etoxib 60 mg filmom obložene tablete  
Etoxib 90 mg filmom obložene tablete  
Etoxib 120 mg filmom obložene tablete**

etorikoksib

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćeće je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

### **Što se nalazi u ovoj uputi**

1. Što je Etoxib i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Etoxib
3. Kako uzimati Etoxib
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Etoxib
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

### **1. Što je Etoxib i za što se koristi**

#### **Što je Etoxib**

- Etoxib sadrži djelatnu tvar etorikoksib. Etoxib je lijek iz skupine lijekova koji se zovu selektivni inhibitori ciklooksigenaze-2 (COX-2). Oni pripadaju većoj skupini lijekova koji se zovu nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL).

#### **Za što se Etoxib koristi?**

- Etoxib pomaže smanjiti bolove i oticanje (upalu) u zglobovima i mišićima u osoba u dobi od 16 godina i starijih koje imaju osteoartritis, reumatoidni artritis, ankirozantni spondilitis i giht.
- Etoxib se također koristi za kratkotrajno liječenje umjereno jake boli nakon stomatološkog kirurškog zahvata u osoba u dobi od 16 ili više godina.

#### **Što je osteoartritis?**

Osteoartritis je bolest zglobova. Nastaje zbog postupnog trošenja hrskavice koja oblaže krajeve kostiju. To uzrokuje oticanje (upalu), bol, osjetljivost, ukočenost i tjelesnu nesposobnost.

#### **Što je reumatoidni artritis?**

Reumatoidni artritis je kronična upalna bolest zglobova. Uzrokuje bol, ukočenost, oticanje zglobova i sve veći gubitak pokretljivosti zahvaćenih zglobova. Također može uzrokovati upalu u drugim organima.

#### **Što je giht?**

Giht je bolest koju karakteriziraju iznenadni, ponavljajući napadaji jake boli, vrlo bolne upale i crvenilo zglobova. Uzrokovani je odlaganjem mineralnih kristala u zglobovima.

#### **Što je ankirozantni spondilitis?**

Ankirozantni spondilitis je upalna bolest koja zahvaća kralježnicu i velike zglobove.

## **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Etoxib**

### **Nemojte uzimati Etoxib**

- ako ste alergični na etorikoksib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični na nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL), uključujući acetilsalicilatnu kiselinu i COX-2 inhibitore (vidjeti 'Moguće nuspojave', dio 4.)
- ako imate aktivan čir na želucu ili krvarenje iz želuca ili crijeva
- ako imate ozbiljnu bolest jetre
- ako imate ozbiljnu bolest bubrega
- ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni ili dojite (vidjeti dio 'Trudnoća, dojenje i plodnost')
- ako ste mlađi od 16 godina
- ako imate upalnu bolest crijeva kao što je Crohnova bolest, ulcerozni kolitis ili kolitis
- ako imate povišen krvni tlak koji nije dobro kontroliran lijekovima koje uzimate (provjerite sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni je li Vaš krvni tlak dobro kontroliran)
- ako Vam je liječnik dijagnosticirao srčane tegobe, uključujući zatajenje srca (umjereni ili teški oblik), anginu (bolovi u prsima)
- ako ste imali srčani udar, operaciju na srcu radi ugradnje premosnice, bolest perifernih arterija (loša cirkulacija u nogama ili stopalima zbog suženih ili začepljениh arterija)
- ako ste imali bilo kakav oblik moždanog udara (uključujući mali moždani udar ili prolazni ishemski napadaj (engl. *trenzitorna ishemiska ataka, TIA*). Etorikoksib može blago povećati rizik od srčanog i moždanog udara, stoga ga ne smiju uzimati bolesnici koji su već imali srčane tegobe ili moždani udar.

Smatrate li da se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lijek dok se ne posavjetujete sa svojim liječnikom.

### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Etoxib ako:

- u povijesti bolesti imate krvarenje ili čir na želucu.
- ste izgubili puno tekućine (ako ste dehidrirani), na primjer zbog dugotrajnog povraćanja ili proljeva.
- ste otekli zbog zadržavanja tekućine u tijelu.
- u povijesti bolesti imate zatajenje srca ili bilo koju drugu bolest srca.
- u povijesti bolesti imate povišen krvni tlak. Etoxib u nekim ljudi može povisiti krvni tlak, posebno pri uzimanju visokih doza lijeka, stoga će Vam liječnik povremeno provjeravati krvni tlak.
- u povijesti bolesti imate bolesti jetre ili bubrega.
- se liječite od neke infekcije. Etoxib može maskirati ili prikriti vrućicu koja je znak infekcije.
- imate šećernu bolest, povišen kolesterol ili pušite. Navedeno može povećati rizik od bolesti srca.
- ste žena koja pokušava zatrudnjeti.
- imate više od 65 godina.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, **razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja lijeka Etoxib** kako biste provjerili je li ovaj lijek prikladan za Vas.

Djelotvornost lijeka Etoxib slična je u starijih i mlađih odraslih bolesnika. Ako imate više od 65 godina, liječnik će Vas željeti redovito nadzirati. Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika starijih od 65 godina.

### **Djeca i adolescenti**

Ovaj lijek ne smijete dati djeci i adolescentima mlađima od 16 godina.

## **Drugi lijekovi i Etoxib**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nakon što počnete uzimati lijek Etoxib, liječnik će Vas možda željeti nadzirati kako bi provjerio djeluju li lijekovi koje uzimate ispravno, osobito ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

- lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi (antikoagulanse), kao što je varfarin
- rifampicin (antibiotik)
- metotreksat (lijek koji potiskuje imunološke reakcije i često se primjenjuje u liječenju reumatoidnog artritisa)
- ciklosporin ili takrolimus (lijekove koji potiskuju imunološke reakcije)
- litij (lijek koji se koristi u liječenju nekih oblika depresije)
- lijekove koji pomažu kontrolirati povišeni krvni tlak i zatajenje srca, a zovu se ACE inhibitori i blokatori angiotenzinskih receptora, kao što su enalapril i ramipril te losartan i valsartan
- diuretike (lijekove za mokrenje)
- digoksin (lijek za liječenje zatajenja srca i nepravilnog srčanog ritma)
- minoksidil (lijek za liječenje povišenog krvnog tlaka)
- salbutamol u tabletama ili oralnoj otopini (lijek za astmu)
- tablete za sprječavanje trudnoće (kombinacija bi mogla povećati rizik od nuspojava)
- hormonsko nadomjesno liječenje (kombinacija bi mogla povećati rizik od nuspojava)
- acetilsalicilatnu kiselinu, pri uzimanju acetilsalicilatne kiseline i lijeka Etoxib povećava se rizik od nastanka čira na želucu.
  - acetilsalicilatna kiselina za sprječavanje srčanog ili moždanog udara:  
Etoxib se može uzimati s **niskim dozama** acetilsalicilatne kiseline. Uzimate li niske doze acetilsalicilatne kiseline za sprječavanje srčanog ili moždanog udara, ne smijete prekidati liječenje acetilsalicilatnom kiselinom dok se ne posavjetujete sa svojim liječnikom.
  - acetilsalicilatna kiselina i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL):  
nemojte uzimati **visoke doze** acetilsalicilatne kiseline ili druge protuupalne lijekove dok uzimate Etoxib.

## **Etoxib s hranom i pićem**

Učinak lijeka Etoxib možda će nastupiti brže kada se uzme bez hrane.

## **Trudnoća, dojenje i plodnost**

### *Trudnoća*

Lijek Etoxib ne smije se uzimati tijekom trudnoće. Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, nemojte uzimati ovaj lijek. Zatrudnite li, prestanite uzimati ovaj lijek i posavjetujte se sa svojim liječnikom. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako niste sigurni ili trebate savjet.

### *Dojenje*

Nije poznato izlučuje li se Etoxib u majčino mlijeko u ljudi. Dojite li ili namjeravate dojiti, posavjetujte sa svojim liječnikom prije nego što počnete uzimati lijek Etoxib. Ako uzimate Etoxib, ne smijete dojiti.

### *Plodnost*

Ne preporučuje se primjena lijeka Etoxib u žena koje pokušavaju zatrudnjeti.

## **Upravljanje vozilima i strojevima**

U nekim su bolesnika u vrijeme uzimanja lijeka Etoxib prijavljene omaglica i pospanost.

Nemojte voziti ako osjetite omaglicu ili pospanost.

Nemojte rukovati alatima niti strojevima ako osjetite omaglicu ili pospanost.

## **Etoxib sadrži natrij**

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po kapsuli, tj. zanemarive količine natrija.

### **3. Kako uzimati Etoxib**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nemojte uzeti više od preporučene doze za Vaše stanje. Liječnik će povremeno htjeti razgovarati o Vašem liječenju. Važno je da uzimate najnižu dozu dovoljnu za ublažavanje боли i da lijek Etoxib ne uzimate dulje nego što je potrebno. Naime, produljenim trajanjem liječenja može se povećati rizik od srčanoga i moždanog udara, posebno pri uzimanju visokih doza lijeka.

Ovaj je lijek dostupan u različitim jačinama, a ovisno o Vašoj bolesti liječnik će Vam propisati jačinu lijeka koja je prikladna za Vas.

Preporučena doza je:

*Osteoartritis*

Preporučena doza je 30 mg jedanput na dan, a ako je potrebno, može se povisiti do najviše doze od 60 mg jedanput na dan.

*Reumatoidni artritis*

Preporučena doza je 60 mg etorikoksiba jedanput na dan. Doza se može povisiti do najviše doze od 90 mg.

*Ankilozantni spondilitis*

Preporučena doza je 60 mg etorikoksiba jedanput na dan. Doza se može povisiti do najviše doze od 90 mg jedanput na dan, ako je potrebno.

*Liječenje akutne boli*

Etoricoxib se smije uzimati samo u vrijeme trajanja akutne boli.

*Giht*

Preporučena doza je 120 mg jedanput na dan, koja se smije uzeti samo u vrijeme trajanja akutne boli, najduže 8 dana liječenja.

*Bol nakon stomatološkog kirurškog zahvata*

Preporučena doza je 90 mg jedanput na dan, najduže 3 dana liječenja.

**Osobe koje imaju tegobe s jetrom**

- Imate li blagu bolest jetre, ne smijete uzimati više od 60 mg na dan.
- Imate li **umjerenu** bolest jetre, ne smijete uzimati više od **30 mg na dan**.

**Primjena u djece i adolescenata**

Etoxib tablete ne smiju uzimati djeca ili adolescenti mlađi od 16 godina.

**Starije osobe**

Nije potrebno prilagođavati dozu u starijih bolesnika. Kao i kod primjene drugih lijekova, potreban je oprez u starijih bolesnika.

Način primjene

Etoxib je namijenjen za primjenu kroz usta. Uzmite tablete jedanput na dan. Etoxib se može uzimati s hranom ili bez nje.

**Ako uzmete više Etoxib nego što ste trebali**

Nikad ne smijete uzeti više tableta nego što Vam je preporučio liječnik. Uzmete li previše Etoxib tableta, odmah potražite liječničku pomoć.

### **Ako ste zaboravili uzeti Etoxib**

Važno je da lijek Etoxib uvijek uzimate kako Vam je propisao Vaš liječničk. Ako ste zaboravili uzeti lijek, sutradan samo nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadiili zaboravljenu tabletu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

### **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

**Ako se u Vas pojave neki od navedenih simptoma, odmah prekinite uzimati lijek Etoxib i razgovarajte sa svojim liječnikom (vidjeti dio 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Etoxib):**

- kratkoća daha, bolovi u prsim ili pojavi oticanja gležnjeva ili pogoršanje istog
- žuta boja kože ili bjeloočnice (žutica) – znakovi koji ukazuju na tegobe s jetrom
- jaki ili stalni bolovi u trbuhi ili crna stolica
- alergijska reakcija – koja može uključivati kožne reakcije kao što su čirevi ili plikovi, ili oticanje lica, usana, jezika ili grla koje može uzrokovati otežano disanje

U vrijeme liječenja lijekom Etoxib zabilježene su sljedeće nuspojave:

***Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):***

- bolovi u trbuhi

***Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):***

- suha alveola (upala i bol nakon vađenja zuba)
- oticanje nogu i/ili stopala zbog zadržavanja tekućine (edem)
- omaglica, glavobolja
- palpitacije (ubrzani ili nepravilni otkucaji srca), nepravilan srčani ritam (aritmija)
- povišen krvni tlak
- piskanje pri disanju ili kratkoća daha (bronhospazam)
- zatvor, vjetrovi (prekomjerni plinovi), gastritis (upala sluznice želuca), žgaravica, proljev, probavne smetnje (dispepsijska)/nelagoda u trbuhi, mučnina, povraćanje, upala jednjaka, rane (ulceracije) u ustima
- promijenjene vrijednosti pretraga krvi koje se odnose na funkciju jetre
- stvaranje modrica (krvnih podljjava)
- opća slabost i umor, simptomi nalik gripi

***Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):***

- gastroenteritis (upala probavnog trakta koja uključuje i želudac i tanko crijevo/želučana viroza), infekcija gornjeg dijela dišnog sustava, infekcija mokraćnih puteva
- promjene laboratorijskih vrijednosti (smanjen broj crvenih krvnih stanica, smanjen broj bijelih krvnih stanica, smanjen broj krvnih pločica (trombocita))
- preosjetljivost (alergijska reakcija uključujući koprivnjaču koja može biti ozbiljna i zahtijevati hitno liječenje)
- povećan ili smanjen tek, porast tjelesne težine
- tjeskoba, depresija, smanjena mentalna oštrina; halucinacije (vidite, osjećate ili čujete stvari koje ne postoje)
- promjena osjeta okusa, nesanica, utrnulost ili trnci, pospanost
- zamagljen vid, nadražene i crvene oči
- zujanje u ušima, vrtoglavica (osjećaj vrtnje tijekom mirovanja)
- poremećaj srčanog ritma (atrijska fibrilacija), ubrzan puls, zatajenje srca, osjećaj stezanja, pritiska ili težine u prsnom košu (angina pektoris), srčani udar
- crvenilo uz osjećaj vrućine, moždani udar, mali moždani udar (prolazni ishemski napadaj),

- jako povišenje krvnog tlaka, upala krvnih žila
- kašalj, nedostatak zraka, krvarenje iz nosa
- nadutost u trbuhu ili crijevima, promjene u radu crijeva, suha usta, čir na želucu, upala sluznice želuca koja može postati ozbiljna i prokrvariti, sindrom nadraženog crijeva, upala gušterače
- oticanje lica, kožni osip ili svrbež, crvenilo kože
- grčevi/stezanje mišića, bolovi/ukočenost u mišićima
- povišene vrijednosti kalija u krvi, promjene u vrijednostima pretraga krvi ili mokraće koje se odnose na funkciju bubrega, teške tegobe s bubrežima
- bolovi u prsimu

**Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):**

- angioedem (alergijska reakcija koja uključuje oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može uzrokovati otežano disanje ili gutanje, a može biti ozbiljna i zahtijevati hitno liječenje)/anafilaktične/anafilaktoidne reakcije uključujući šok (ozbiljna alergijska reakcija koja zahtijeva hitno liječenje)
- smetenost, nemir
- tegobe s jetrom (hepatitis)
- snižene vrijednosti natrija u krvi
- zatajenje jetre, žuta boja kože i/ili bjeloočnica (žutica)
- teške kožne reakcije

**Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava; navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## 5. Kako čuvati Etoxib

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

### Što Etoxib sadrži

- Djetalna tvar je etorikoksib.  
Jedna filmom obložena tableta sadrži 30 mg, 60 mg, 90 mg ili 120 mg etorikoksiba.
- Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, kalcijev hidrogenfosfat, umrežena karmelozanatrij, natrijev stearilfumarat, bezvodni koloidni silicijev dioksid u jezgri tablete i poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), makrogol 3000, talk, žuti željezov oksid (E172) (u *Etoxib 60 mg filmom obloženim tabletama*) i crveni željezov oksid (E172) (u *Etoxib 90 mg i 120 mg filmom obloženim tabletama*) u film ovojnici. Vidjeti dio 2. „Etoxib sadrži natrij“.

### Kako Etoxib izgleda i sadržaj pakiranja

Etoxib filmom obložene tablete dostupne su u četiri jačine:

Etoxib 30 mg filmom obložene tablete su bijele ili gotovo bijele, okrugle (promjer: 6 mm), blago bikonveksne, filmom obložene tablete s ukošenim rubovima.

Etoxib 60 mg filmom obložene tablete su svijetlo smeđkasto žute, okrugle (promjer: 8 mm), bikonveksne, filmom obložene tablete s ukošenim rubovima, s utisnutom oznakom "60" na jednoj strani tablete.

Etoxib 90 mg filmom obložene tablete su ružičaste, okrugle (promjer: 9 mm), bikonveksne, filmom obložene tablete s ukošenim rubovima, s utisnutom oznakom "90" na jednoj strani tablete.

Etoxib 120 mg filmom obložene tablete su smeđkasto crvene, okrugle (promjer: 10 mm), blago bikonveksne, filmom obložene tablete s ukošenim rubovima, s razdjelnim urezom na jednoj strani tablete. Razdjelni urez nije namijenjen za lomljenje tablete.

*Etoxib 30 mg filmom obložene tablete*

Dostupne su u kutiji sa po 7, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98 ili 100 tableta u blisterima.

*Etoxib 60 mg filmom obložene tablete*

Dostupne su u kutiji sa po 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 ili 100 tableta u blisterima.

*Etoxib 90 mg filmom obložene tablete*

Dostupne su u kutiji sa po 5, 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 ili 100 tableta u blisterima.

*Etoxib 120 mg filmom obložene tablete*

Dostupne su u kutiji sa po 5, 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 ili 100 tableta u blisterima.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet**

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

**Proizvođač**

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

**Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora i Ujedinjenoj Kraljevini (Sjevernoj Irskoj) pod slijedećim nazivima:**

| Država   | Naziv lijeka    |
|--|-----------------|
| Belgija, Danska, Finska, Irska, Island, Norveška, Španjolska, Švedska        | Etoricoxib Krka |
| Bugarska, Češka Republika, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija | Roticox         |
| Njemačka   | Etoriavax       |
| Estonija, Hrvatska   | Etoxib          |
| Litva, Latvija   | Bericox         |
| Portugal   | Etoricoxib TAD  |
| Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)                                       | Etoricoxib      |

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2024.**