

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Mikofenolatna kiselina Accord 180 mg želučanootporne tablete Mikofenolatna kiselina Accord 360 mg želučanootporne tablete

mikofenolatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćeće je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestruru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Mikofenolatna kiselina Accord i za što se koristi
2. Sto morate znati prije nego počnete uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord
3. Kako uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Mikofenolatna kiselina Accord
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Mikofenolatna kiselina Accord i za što se koristi

Mikofenolatna kiselina Accord sadrži djelatnu tvar zvanu mikofenolatna kiselina. Ona pripada skupini lijekova pod nazivom imunosupresivi.

Mikofenolatna kiselina Accord se koristi za sprječavanje imunološkog sustava organizma da odbaci presađeni bubreg. Koristi se zajedno s drugim lijekovima koji sadrže ciklosporin i kortikosteroide.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord

UPOZORENJE

Mikofenolat uzrokuje prirodene mane i spontani pobačaj. Ako ste žena koja bi mogla zatrudnjeti, prije početka liječenja morate predociti negativan nalaz testa na trudnoću i morate se pridržavati savjeta o kontracepciji koje Vam je dao Vaš liječnik.

Vaš će liječnik razgovarati s Vama i dati Vam pisane informacije, osobito o učincima mikofenolata na nerođenu djecu. Pažljivo pročitajte informacije i pridržavajte se uputa.

Ako ne razumijete upute u potpunosti, zamolite liječnika da Vam ih još jednom objasni prije nego što uzmete mikofenolat. Za više informacija pogledajte i dio „Upozorenja i mjere opreza“ te dio „Trudnoća i dojenje“, koji se nalaze u ovome dijelu.

Nemojte uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord

- ako ste alergični na mikofenolatnu kiselinu, mikofenolatnatrij, mofetilmikofenolat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
- ako ste žena koja bi mogla zatrudnjeti, a niste predocili negativan nalaz testa na trudnoću prije nego što Vam je prvi put propisan ovaj lijek, jer mikofenolat uzrokuje prirodene mane i spontani pobačaj.

H A L M E D
28 - 10 - 2024
O D O B R E N O

- ako ste trudni, planirate zatrudnjeti ili mislite da biste mogli biti trudni.
- ako ne koristite učinkovitu kontracepciju (pogledajte dio „Kontracepcija u žena i muškaraca“).
- ako dojite (pogledajte također i dio "Trudnoća i dojenje").

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika i nemojte uzeti lijek Mikofenolatna kiselina Accord.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek Mikofenolatna kiselina Accord

- ako imate ili ste imali ozbiljne probavne smetnje, kao što je čir na želucu.
- ako imate rijetki nasljedni nedostatak enzima hipoksantin-gvanin-fosforibozil-transferaze (HGPRT), kao što je Lesch-Nyhanov ili Kelley-Seegmillerov sindrom.

Također morate biti svjesni sljedećeg:

- Mikofenolatna kiselina Accord smanjuje razinu zaštite kože od sunca. To povećava rizik od raka kože. Morate ograničiti Vaše izlaganje suncu i ultraljubičastim (UV) zrakama prekrivanjem izloženih dijelova kože što je više moguće i redovitim korištenjem kreme za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom. Upitajte svog liječnika za savjet o zaštiti od sunca.
- Ako ste već imali hepatitis B ili C, Mikofenolatna kiselina Accord može povećati rizik od ponovnog nastupa tih bolesti. Liječnik Vam može napraviti analizu krvi i provjeriti imate li simptome tih bolesti. Ako primijetite bilo kakve simptome (žutilo kože ili očiju, mučninu, gubitak apetita, tamnu mokraću), morate odmah obavijestiti Vašeg liječnika.
- Ako počnete ustrajno kašljati ili počnete gubiti dah, posebice ukoliko uzimate druge imunosupresive, odmah obavijestite svog liječnika.
- Ukoliko imate ponavljane infekcije, a posebno ako uzimate druge imunosupresive, Vaš liječnik će možda tijekom liječenja provjeravati razinu protutijela u krvi te Vam reći možete li dalje nastaviti uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord.
- U slučaju bilo kojeg znaka infekcije (npr. vrućice ili grlobolje), neočekivanih modrica ili krvarenja, odmah morate obavijestiti svog liječnika.
- Vaš liječnik će možda tijekom liječenja lijekom Mikofenolatna kiselina Accord provjeravati broj bijelih krvnih stanica te će Vam reći da li možete nastaviti s uzimanjem lijeka Mikofenolatna kiselina Accord.
- Djelatna tvar, mikofenolatna kiselina, nije ista kao neka druga djelatna tvar koja slično zvuči, npr. mofetilmikofenolat. Ne biste smjeli mijenjati lijekove, osim ako Vam to ne kaže Vaš liječnik.
- Primjena lijeka Mikofenolatna kiselina Accord u trudnoći može štetiti plodu (vidi također "Trudnoća i dojenje") i povećati rizik od gubitka trudnoće, što uključuje i spontani pobačaj.

Drugi lijekovi i Mikofenolatna kiselina Accord

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Osobito morate porazgovarati sa svojim liječnikom ako uzimate bilo što od sljedećeg:

- Druge imunosupresivne lijekove, kao što su azatioprin ili takrolimus.
- Lijekove koji se koriste za liječenje povišenih razina kolesterolja u krvi, kao što je kolestiramin.
- Aktivni ugljen koji se koristi za liječenje probavnih poteškoća, kao što su proljev, želučane tegobe i vjetrovi.
- Antacide koji sadrže magnezij i aluminij.
- Lijekove koji se koriste za liječenje virusnih infekcija, kao što su aciklovir ili ganciklovir.

Također morate obavijestiti svog liječnika ako planirate ići na bilo kakvo **cijepljenje**.

Tijekom liječenja lijekom Mikofenolatna kiselina Accord i najmanje 6 tjedana nakon prestanka liječenja ne smijete darivati krv. Muškarci ne smiju donirati spermu tijekom liječenja lijekom Mikofenolatna kiselina Accord i najmanje 90 dana nakon prestanka liječenja.

Mikofenolatna kiselina Accord s hranom i pićem

Lijek Mikofenolatna kiselina Accord možete uzimati s hranom ili bez nje. Morate odabrat da li ćete uzimati Vaše tablete s ili bez hrane i zatim ih uzimati na isti način svaki dan. To je potrebno da se osigura apsorbiranje iste količine lijeka u Vašem organizmu svaki dan.

Starije osobe

Starije osobe (u dobi od 65 godina ili starije) mogu uzimati ovaj lijek bez potrebe za prilagođavanjem uobičajenih preporučenih doza.

Djeca i adolescenti

Primjena ovog lijeka u djece i adolescenata se ne preporučuje zbog nedovoljno podataka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Vaš će liječnik razgovarati s Vama o rizicima u slučaju trudnoće i drugim mogućim mjerama koje možete poduzeti da biste spriječili odbacivanje presađenog organa:

- Ako planirate zatrudnjeti.
- Ako Vam izostane mjesečnica ili mislite da Vam je izostala mjesečnica, ako imate neuobičajeno menstrualno krvarenje ili ako mislite da biste mogli biti trudni.
- Ako stupite u spolni odnos bez učinkovite metode kontracepcije.

Ako ipak zatrudnite tijekom liječenja mikofenolatom morate odmah obavijestiti svog liječnika. Međutim, nastavite uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord sve dok ga ne posjetite.

Trudnoća

Mikofenolat vrlo često uzrokuje spontani pobačaj (50%) i teške prirođene mane (23 – 27%) kod nerođenog djeteta. Prijavljeni prirođeni mane uključuju anomalije ušiju, očiju, lica (rascjep usne/nepca), razvoja prstiju, srca, jednjaka (cijevi koja povezuje grlo sa želucem), bubrega i živčanog sustava (npr. *spina bifida* [kod koje se kosti kralježnice nisu pravilno razvile]). Vaše dijete može imati jednu ili više takvih mana.

Ako ste žena koja bi mogla zatrudnjeti, prije početka liječenja morate predočiti negativan nalaz testa na trudnoću i morate se pridržavati savjeta o kontracepciji koje Vam je dao Vaš liječnik. Vaš liječnik može zatražiti da napravite više od jednoga testa prije liječenja, kako bi bio siguran da niste trudni.

Dojenje

Nemojte uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord ako dojite. To je zato što male količine lijeka mogu prijeći u majčino mlijeko.

Kontracepcija u žena koje uzimaju lijek Mikofenolatna kiselina Accord

Ako ste žena koja bi mogla zatrudnjeti, uz lijek Mikofenolatna kiselina Accord morate koristiti učinkovitu metodu kontracepcije.

To uključuje:

- Razdoblje prije početka uzimanja lijeka Mikofenolatna kiselina Accord
- Čitavo razdoblje liječenja lijekom Mikofenolatna kiselina Accord
- Razdoblje od 6 tjedana nakon što prestanete uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord

Razgovarajte s Vašim liječnikom o tome koja bi kontracepcija bila najbolja za Vas. To će ovisiti o Vašoj individualnoj situaciji. Prednost se daje uporabi dvaju oblika kontracepcije jer time se smanjuje rizik od neplanirane trudnoće. **Obratite se svom liječniku što je prije moguće, ako mislite da Vaša kontracepcija možda nije bila učinkovita ili ste zaboravili uzeti kontracepciju pilulu.**

U slučaju da se bilo koji od sljedećih navoda odnosi na Vas, Vi ste žena koja ne može zatrudnjeti:

- U postmenopauzi ste, tj. imate najmanje 50 godina i Vaša zadnja menstruacija je bila prije više od jedne godine (ako su Vaše menstruacije prestale zato što ste se liječili od raka, tada još uvijek postoji šansa da možete zatrudnjeti).
- Vaši jajovodi i oba jajnika su odstranjeni operacijom (obostrana salpingo-ooforektomija)

HALMED

28 - 10 - 2024

ODOBRENO

- Vaša je maternica (uterus) odstranjena operacijom (histerektomija).
- Vaši jajnici više ne rade (prerani prestanak jajnika, što je potvrdio specijalist ginekolog).
- Rođeni ste s jednim od sljedećih rijetkih urođenih stanja koja onemogućuju trudnoću: XY genotip, Turnerov sindrom ili ageneza uterusa (potpuni izostanak razvoja maternice i njenog vrata).
- Vi ste dijete ili adolescentica koja još nije počela dobivati menstruacije.

Kontracepcija u muškaraca koji uzimaju lijek Mikofenolatna kiselina Accord

Dostupni dokazi ne ukazuju na povećan rizik od malformacija ili spontanog pobačaja ako otac uzima mikofenolat. Međutim, rizik se ne može u potpunosti isključiti. Kao mjera opreza, preporuča se da Vi ili Vaša partnerica koristite pouzdanu kontracepciju tijekom liječenja i još 90 dana nakon što prestanete uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord.

Ako planirate imati dijete, razgovarajte s Vašim liječnikom o mogućim rizicima.

Upravljanje vozilima i strojevima

Mikofenolatna kiselina Accord nije pokazala utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Mikofenolatna kiselina Accord sadrži natrij

Za jačinu 180 mg:

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tabletu, tj. zanemarive količine natrija.

Za jačinu 360 mg:

Ovaj lijek sadrži 27,9 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj tabletu. To odgovara 1,4 % maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu.

3. Kako uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Lijek Mikofenolatna kiselina Accord će Vam propisati jedino liječnik s iskustvom u liječenju bolesnika s presađenim organom. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko uzeti

Preporučena dnevna doza lijeka Mikofenolatna kiselina Accord iznosi 1440 mg (8 tableta od 180 mg ili 4 tablete od 360 mg). To se uzima kao 2 odvojene doze od po 720 mg svaka (4 tablete od 180 mg ili 2 tablete od 360 mg).

Vaše tablete uzimajte ujutro i navečer.

Prvu dozu od 720 mg ćete dobiti unutar 72 sata nakon presađivanja.

Ako imate ozbiljnih poteškoća s bubrežima

Vaša dnevna doza ne smije biti veća od 1440 mg (8 tableta od 180 mg ili 4 tablete od 360 mg).

Način primjene lijeka Mikofenolatna kiselina Accord

Za primjenu kroz usta.

Progutajte cijele tablete s čašom vode.

Tablete nemojte lomiti niti mrviti.

Nemojte uzeti tabletu koja je oštećena ili prelomljena.

Liječenje će trajati onoliko dugo koliko trebate imunosupresiju za spriječavanje odbacivanja presađenog organa.

Ako uzmete više lijeka Mikofenolatna kiselina Accord nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Mikofenolatna kiselina Accord nego što ste trebali, ili ako je netko drugi uzeo Vaše tablete, odmah porazgovarajte s liječnikom ili otidite u bolnicu. Možda će biti potrebna medicinska pomoć. Tablete ponesite sa sobom i pokažite ih liječniku ili bolničkom osoblju. Ako ste potrošili sve tablete, ponesite sa sobom prazno pakiranje.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Mikofenolatna kiselina Accord

Ako ste zaboravili uzeti lijek Mikofenolatna kiselina Accord, uzmite ga čim se sjetite, osim ako uskoro nije vrijeme za Vašu sljedeću dozu. Zatim uzmite Vašu sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Posavjetujte se sa svojim liječnikom. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord

Nemojte prestati uzimati lijek Mikofenolatna kiselina Accord, osim ako vam to ne kaže Vaš liječnik. Prestanak uzimanja ovog lijeka može povećati rizik da Vaše tijelo odbaci presađeni bubreg.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Stariji bolesnici mogu imati više nuspojava zbog smanjene imunološke obrane.

Imunosupresivi, uključujući lijek Mikofenolatna kiselina Accord, smanjuju vlastite obrambene mehanizme organizma kako bi spriječili odbacivanje presađenog organa. Posljedično, Vaš organizam se neće tako dobro boriti protiv infekcija, kao što je to normalno. Stoga, ako uzimate lijek Mikofenolatna kiselina Accord, možete biti skloniji infekcijama nego što je uobičajeno, kao što su infekcije mozga, kože, usta, želuca i crijeva, pluća i mokraćnog sustava.

Vaš liječnik će vam propisati redovite kontrole krvi kako bi nadzirao moguće promjene u broju krvnih stanica ili promjene u razinama različitih tvari koje se prenose krvlju, kao što su šećer, masnoće i kolesterol.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne:

- Znakovi infekcije koji uključuju vrućicu, zimicu, znojenje, osjećaj umora, pospanost ili nedostatak energije. Ukoliko uzimate lijek Mikofenolatna kiselina Accord, možete biti skloniji virusnim, bakterijskim ili gljivičnim infekcijama nego što je to uobičajeno. Te infekcije mogu zahvatiti razne dijelove tijela, no najčešće zahvaćeni dijelovi su bubrezi, mokraćni mjeđur te gornji i/ili donji dišni putovi.
- Povraćanje krvi, crna ili krvava stolica, čir želuca ili crijeva.
- Oticanje žljezda, pojava nove kožne izrasline ili povećanje postojeće kožne izrasline ili promjene na postojećem madežu. Kao što je i inače moguća pojava u bolesnika koji uzimaju imunosupresivne lijekove, tako je i vrlo malen broj bolesnika liječenih lijekom Mikofenolatna kiselina Accord razvio rak kože ili limfnih čvorova.

Ako se nakon uzimanja lijeka Mikofenolatna kiselina Accord kod Vas javi bilo što od gore navedenog, odmah porazgovarajte sa svojim liječnikom.

Ostale nuspojave mogu uključivati:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

- smanjenje razine bijelih krvnih stanica
- snižena razina kalcija u krvi (hipokalcijemija)
- snižena razina kalija u krvi (hipokalijemija)
- povиšena razina mokraćne kiseline u krvi (hiperuricemija)
- visoki krvni tlak (hipertenzija)
- tjeskoba
- proljev
- bolovi u zglobovima (artralgija)

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- smanjenje razine crvenih krvnih stanica, što može rezultirati umorom, nedostatkom zraka i blijedim izgledom (anemija)
- smanjenje razine krvnih pločica što može rezultirati neočekivanim krvarenjem i nastankom modrica (trombocitopenija)
- povišena razina kalija u krvi (hiperkalemija)
- snižena razina magnezija u krvi (hipomagnezijemija)
- omaglica
- glavobolja
- kašalj
- nizak krvni tlak (hipotenzija)
- otežano disanje, zaduha (dispneja)
- bol u želucu ili trbuhu, upala sluznice želuca, nadutost trbuha, zatvor, loša probava, vjetrovi, meka stolica, mučnina, povraćanje
- umor, vrućica
- poremećeni nalazi pretraga jetrene ili bubrežne funkcije
- infekcije dišnog sustava
- akne
- slabost (astenija)
- bol u mišićima (mialgija)
- otečene šake, gležnjevi ili stopala (periferni edem)
- svrbež

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- ubrzani (tahikardija) ili nepravilni otkucaji srca (ventrikularna ekstrasistolija), nakupljanje tekućine u plućima (plućni edem)
- izraslina koja nalikuje vrećici (*cista*), a sadrži tekućinu (*limfu*) (limfokela)
- nevoljno drhtanje, poremećaj spavanja
- crvenilo i oticanje očiju (konjunktivitis), zamućen vid
- piskanje pri disanju
- podrigivanje, zadah, začepljenje crijeva, ulceracija usni, žgaravica, promjena boje jezika, suhoća usta, upala zubnog mesa, upala gušterice koja dovodi do jake boli u gornjem dijelu trbuha, začepljenje žljezda slinovnica, upala potrbušnice
- infekcija kostiju, krvi i kože
- krv u mokraći, oštećenje bubrega, bol i otežano mokrenje
- opadanje kose, stvaranje modrica na koži
- upala zglobova (artritis), bolovi u leđima, grčevi u mišićima
- gubitak apetita, povećanje razine masnoća (hiperlipidemija), šećera (dijabetes) i kolesterola (hiperkolesterolemija) u krvi ili smanjenje razine fosfata u krvi (hipofosfatemija)
- znakovi gripe (kao što su umor, zimica, grlobolja, bolovi u zglobovima ili mišićima), oticanje gležnjeva i stopala, bol, tresavica, osjećaj žeđi ili slabosti
- neuobičajeni snovi, vjerovanje u neistinite stvari (obmanutost)
- nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije
- kašalj, poteškoće u disanju, bolno disanje (mogući simptomi intersticijске bolesti pluća)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- osip
- vrućica, grlobolja, učestale infekcije (mogući simptomi nedostatka bijelih krvnih stanica u krvi) (agranulocitoza)

Ostale nuspojave prijavljene za lijekove slične lijeku Mikofenolatna kiselina Accord

Za grupu lijekova kojoj pripada lijek Mikofenolatna kiselina Accord prijavljene su dodatne nuspojave:

upala debelog crijeva, upala sluznice želuca izazvana citomegalovirusom, pojava rupe u stijenci crijeva što rezultira jakom boli u trbuhu i mogućim krvarenjem, čir želuca ili dvanaesnika, smanjenje razine određene vrste bijelih krvnih stanica ili svih krvnih stanica, ozbiljne infekcije, kao što su upala srca i njegovih zalistaka i ovojnica koja oblaže mozak i leđnu moždinu, nedostatak zraka, kašalj, koji mogu biti uzrokovani bronhiktazijama (stanjem u kojem su dišni putovi u plućima neuobičajeno prošireni) te druge manje česte bakterijske infekcije koje obično rezultiraju ozbiljnom bolešću pluća (*tuberkuloza i atipična mikobakterijska infekcija*). Porazgovarajte sa svojim liječnikom ako se kod Vas razvije ustrajni kašalj ili nedostatak zraka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestruru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Mikofenolatna kiselina Accord

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite vidljive znakove odstupanja u kakvoći.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Mikofenolatna kiselina Accord sadrži

- Djelatna tvar je mikofenolatna kiselina (u obliku mikofenolatnatrija). Jedna tableta sadrži 180 mg ili 360 mg mikofenolatne kiseline.
- Drugi sastojci su:
Jezgra tablete: celuloza, mikrokristalična (E460); karmelozanatrij, umrežena (E468); povidon K30 (E1201); talk (E553b); silicijev dioksid, koloidni, bezvodni (E551); magnezijev stearat (E470b).

Ovojnica tablete 180 mg: metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer 1:1; talk (E553b); titanijev dioksid (E171); trietilcitrat (E1505); silicijev dioksid, koloidni, bezvodni (E551); natrijev hidrogenkarbonat (E500); žuti željezov oksid (E172); indigotin (E 132); natrijev laurilsulfat (E487).

Ovojnica tablete 360 mg: metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer 1:1; talk (E553b); titanijev dioksid (E171); trietilcitrat (E1505); silicijev dioksid, koloidni, bezvodni (E551); natrijev hidrogenkarbonat (E500); žuti željezov oksid (E172); crveni željezov oksid (E172); natrijev laurilsulfat (E487).

Oznaka: šelak (E904), crni željezov oksid (E172), propilenglikol (E1520).

Kako Mikofenolatna kiselina Accord izgleda i sadržaj pakiranja

Mikofenolatna kiselina Accord 180 mg želučanootporne tablete su svjetlo zelene, filmom obložene okrugle tablete, bikonveksno zakrivljenih ploha i koso odrezanih rubova s crnom oznakom M1 na jednoj strani.

Mikofenolatna kiselina Accord 360 mg želučanootporne tablete su boje breskve, filmom obložene tablete ovalnog oblika, bikonveksno zakriviljenih ploha i koso odrezanih rubova s crnom oznakom M2 na jednoj strani.

Tablete od 180 mg su dostupne u blister pakiranju od 20, 50, 100, 120 i 250 tableta, a tablete od 360 mg su dostupne u blister pakiranju od 50, 100, 120 i 250 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Ul. Tasmowa 7, Varšava
Poljska

Proizvođači

PharmaS d.o.o.

Radnička cesta 47
10 000 Zagreb

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Lutomierska 50
Pabianice 95-200
Poljska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PharmaS d.o.o.

Radnička cesta 47
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 5509 375
Fax: +385 1 6285 222
E-mail: info@pharmas.hr

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2024.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode na <http://www.halmed.hr>.