

## **Uputa o lijeku: Informacije za korisnika**

### **Nurofen Cold and Flu 200 mg + 30 mg filmom obložene tablete**

ibuprofen, pseudoefedrinklorid

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije ili ako Vam je lijek potreban dulje od 4 dana (odrasli), odnosno 3 dana (adolescenti).

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je Nurofen Cold and Flu i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nurofen Cold and Flu
3. Kako uzimati Nurofen Cold and Flu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Nurofen Cold and Flu
6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

#### **1. Što je Nurofen Cold and Flu i za što se koristi**

Nurofen Cold and Flu filmom obložene tablete sadrže dvije djelatne tvari, a to su ibuprofen i pseudoefedrin.

Ibuprofen pripada skupini nesteroidnih protuupalnih lijekova i antireumatika koji smanjuju bol, oticanje i povišenu tjelesnu temperaturu.

Pseudoefedrin pripada skupini lijekova koji se nazivaju vazokonstriktori, a djeluje tako da sužava krvne žile u nosu i smanjuje začepljenost nosa.

Nurofen Cold and Flu se koristi za ublažavanje obične prehlade i simptoma gripe, uključujući bolove, glavobolju, grlobolju, povišenu tjelesnu temperaturu te začepljenost nosa i sinusa u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije ili ako Vam je lijek potreban dulje od 4 dana (odrasli), odnosno 3 dana (adolescenti).

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nurofen Cold and Flu**

##### **Nemojte uzimati Nurofen Cold and Flu:**

- ako ste alergični na ibuprofen, pseudoefedrin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični na acetilsalicilatnu kiselinu ili neki drugi nesteroidni protuupalni lijek
- ako ste imali napadaj astme, otežano disanje, curenje i svrbež nosa, koprivnjaču (kožna anafilaktična reakcija obilježena svrbežom, crvenilom kože i oteklinama), ili oticanje lica, jezika i grla povezano s uzimanjem ibuprofena, acetilsalicilatne kiseline ili nekog drugog nesteroidnog protuupalnog lijeka
- ako ste imali ili imate aktivan čir na želucu ili dvanaesniku ili krvarenje iz probavnog sustava
- ako ste imali krvarenje ili puknuće u probavnom sustavu vezano uz terapiju nesteroidnim protuupalnim lijekovima

- ako imate teški poremećaj jetrene funkcije
- ako imate tešku akutnu (iznenadnu) ili kroničnu (dugotrajnu) bubrežnu bolest ili zatajenje bubrega
- ako imate teško zatajenje srca
- ako imate vrlo visok krvni tlak (tešku hipertenziju) ili hipertenziju koja nije kontrolirana lijekovima koje uzimate
- ako imate problema sa srcem ili cirkulacijom uključujući anginu pektoris i tahikardiju (ubrzani rad srca)
- ako imate šećernu bolest
- ako imate povišeni očni tlak
- ako imate pojačan rad štitnjače ili povećanu prostatu
- ako bolujete od feokromocitoma (tumora nadbubrežne žljezde)
- ako uzimate ili ste unutar 14 dana uzimali lijekove iz skupine inhibitora monoaminoooksidaze (koriste se za liječenje depresije) kao što je moklobemid
- ako uzimate dihidroergotamin (koristi se za liječenje migrene)
- ako ste trudni
- ako ste mlađi od 12 godina.

### **Upozorenja i mjere opreza**

Znakovi alergijske reakcije na ovaj lijek, uključujući probleme s disanjem, oticanje područja lica i vrata (angioedem) i bol u prsnom košu, prijavljeni su kod primjene ibuprofena. Odmah prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu i potražite liječničku ili hitnu medicinsku pomoć ako primijetite bilo koji od navedenih znakova.

Protuupalni lijekovi/lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu biti povezani s blago povećanim rizikom od srčanog ili moždanog udara, naročito kada se upotrebljavaju u visokim dozama. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje liječenja.

Iznenadna bol u trbuhi ili krvarenje iz završnog dijela crijeva (rektuma) mogu se javiti kod primjene ovog lijeka kao posljedica upale debelog crijeva (ishemijski kolitis). Ako primijetite ove simptome vezane uz probavni sustav, prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu i odmah se obratite svom liječniku ili potražite medicinsku pomoć (pogledajte dio 4.).

Tijekom primjene ovog lijeka, može doći do smanjenja protoka krvi do Vašeg očnog živca. U slučaju pojave iznenadnog gubitka vida, prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu i odmah se obratite svom liječniku ili potražite medicinsku pomoć (pogledajte dio 4.).

Nakon primjene lijekova koji sadrže pseudoefedrin prijavljeni su slučajevi sindroma posteriorne reverzibilne encefalopatije (engl. *posterior reversible encephalopathy syndrome*, PRES) i sindroma reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije (engl. *reversible cerebral vasoconstriction syndrome*, RCVS). PRES i RCVS rijetki su poremećaji koji mogu uključivati smanjenu opskrbu mozga krvlju. Ako se pojave simptomi koji bi mogli biti znakovi PRES-a ili RCVS-a, prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu i odmah potražite liječničku pomoć (pogledajte simptome u dijelu 4. *Moguće nuspojave*).

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Nurofen Cold and Flu ako:

- imate srčanih problema, uključujući zatajenje srca, anginu (bol u prsištu), ili ako ste imali srčani udar, ugradnju premosnice, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u stopalima zbog uskih ili začepljenih žila) ili bilo koju vrstu moždanog udara (uključujući "mini moždani udar" ili prolazni ishemski napadaj)
- imate visoki krvni tlak, dijabetes, visoki kolesterol, povijest srčane bolesti ili moždanog udara u obitelji, ili ako ste pušač
- bolujete od bronhalne astme ili alergije jer primjena ovog lijeka može uzrokovati napadaj bronhospazma (suženje dišnih puteva)
- bolujete od nekih bolesti imunološkog sustava (sistemska eritemski lupus, miješana sistemska bolest vezivnog tkiva)

- bolujete od upalne bolesti crijeva (ulcerozni kolitis, Crohnova bolest) jer primjena ovoga lijeka može pogoršati stanje ovih bolesti
- patite od nekih drugih probavnih smetnji. Ako tijekom primjene ovog lijeka dođe do krvarenja iz probavnog sustava (ili pojave neuobičajenih simptoma u području trbuha), odmah prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu i obratite se liječniku.
- imate poremećenu bubrežnu ili jetrenu funkciju
- lijek planirate primjenjivati kod dehidrirane djece i adolescenata jer postoji rizik od oštećenja bubrega
- imate hipertireoidizam (pojačanu aktivnost štitnjače)
- uzimate druge lijekove iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova, uključujući i selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 (pogledajte dio 2. *Drugi lijekovi i Nurofen Cold and Flu*)
- uzimate druge lijekove koji su navedeni u dijelu 2. *Drugi lijekovi i Nurofen Cold and Flu*
- ako ste starije životne dobi jer postoji veća učestalost nuspojava, osobito krvarenja i puknuća u probavnom sustavu, koje mogu imati i smrtni ishod
- ako imate problema sa začećem jer ovaj lijek može imati blagi utjecaj na ovulaciju te može dovesti do prolaznog smanjenja plodnosti kod žena, a koje se povlači nakon prestanka uzimanja lijeka
- primijetite simptome kao što su halucinacije, nemir, poremećaj spavanja. Ako tijekom primjene ovog lijeka uočite navedene simptome, odmah prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu.
- imate infekciju (pogledajte podnaslov *Infekcije* niže u tekstu).

#### Kožne reakcije

Ozbiljne kožne reakcije prijavljene su tijekom liječenja ovim lijekom. Odmah prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu i potražite liječničku pomoć ako Vam se pojavi bilo kakav osip na koži, oštećenje sluznice, mjehurići ili drugi znakovi alergije jer to mogu biti prvi znakovi vrlo ozbiljne kožne reakcije (pogledajte dio 4.).

Također, ako razvijete opće crvenilo kože praćeno vrućicom i gnojnim prištićima, prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu i odmah se obratite svom liječniku ili potražite medicinsku pomoć (pogledajte dio 4.).

#### Infekcije

Nurofen Cold and Flu može prikriti znakove infekcija kao što su vrućica i bol. Nurofen Cold and Flu može odgoditi odgovarajuće liječenje infekcije (poput bakterijske upale pluća i bakterijskih infekcija kože povezanih s vodenim kozicama), što može dovesti do povećanog rizika od komplikacija. Ako uzimate ovaj lijek dok imate infekciju, a simptomi infekcije ustraju ili se pogoršaju, odmah se obratite liječniku.

Nuspojave se mogu umanjiti primjenom najniže učinkovite doze kroz najkraće moguće vrijeme potrebno da se ublaže simptomu bolesti.

#### **Drugi lijekovi i Nurofen Cold and Flu**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ovaj lijek može utjecati na druge lijekove ili na njega mogu utjecati drugi lijekovi, poput:

- lijekova koji se koriste za razrjeđivanje krvi (antikoagulansi, primjerice acetilsalicilatna kiselina, varfarin, tiklopidin)
- određenih lijekova koji se koriste se za snižavanje povišenog krvnog tlaka (antihipertenzivi iz skupine ACE-inhibitora, antagonista receptora angiotenzina II ili beta-blokatora).

Prije uzimanja ovog lijeka savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom ako uzimate jedan od sljedećih lijekova:

- acetilsalicilatnu kiselinu (koristi se u niskim dozama za razrjeđivanje krvi), jer može doći do smanjenog učinka razrjeđivanja krvi
- neki drugi nesteroidni protuupalni lijek (uključujući inhibitor ciklooksigenaze-2), jer to može povećati rizik od nuspojava

- kortikosteroide (koriste se za liječenje upala), jer to može povećati rizik od čireva i krvarenja u probavnom sustavu
- lijekove koji se koriste za razrjeđivanje krvi (oralni antikoagulansi, npr. varfarin), jer to može povećati rizik od krvarenja
- lijekove koji se koriste za snižavanje povišenog krvnog tlaka (antihipertenzivi) ili lijekove koji povećavaju izlučivanje mokraće (diuretici), jer može doći do smanjenog učinka ovih lijekova i povećanog rizika od oštećenja bubrega
- litij (koristi se za liječenje psihotičnih poremećaja), jer učinak litija može biti pojačan
- metotreksat (koristi se za liječenje pojačanog imunološkog odgovora), jer učinak metotreksata može biti pojačan
- zidovudin (koristi se za liječenje infekcije HIV-virusom), jer to može rezultirati pojačanim rizikom od krvarenja u zglobove ili krvarenja koje uzrokuje oticanje kod HIV-pozitivnih (+) bolesnika
- lijekove iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotoninina (koriste se za liječenje depresije), jer to može povećati rizik od krvarenja u probavnom sustavu
- lijekove iz skupine inhibitora monoaminoooksidaze (MAOI) i/ili reverzibilnih inhibitora monoaminoooksidaze (RIMA) (koriste se za liječenje depresije)
- kinolonske antibiotike (koriste se za liječenje bakterijskih infekcija)
- simpatomimetike poput dekongestiva (koriste se za liječenje začepljenog nosa), jer može doći do pojačanog učinka lijeka Nurofen Cold and Flu
- psihostimulanse (koriste se za povećanje psihofizičkih sposobnosti) ili lijekove za suzbijanje apetita, jer može doći do pojačanog učinka lijeka Nurofen Cold and Flu
- lijekove iz skupine tricikličkih antidepresiva (koriste se za liječenje depresije)
- gvanetidin, rezerpin, metildopu, glikozide digitalisa (srčani glikozidi) (koriste se za liječenje srčanih bolesti i povišenog krvnog tlaka)
- ergot alkaioide (ergotamin i metisergid) (koriste se za liječenje migrena)
- oksitocin (koristi se za poticanje trudova i izlučivanja mlijeka), jer postoji rizik od povišenog krvnog tlaka
- mifepriston (koristi se za prekid trudnoće). Nurofen Cold and Flu se ne smije uzeti unutar 8-12 dana nakon primjene ovog lijeka.
- antikolinergike (koriste se za liječenje različitih stanja povezanih s pretjeranim lučenjem acetilkolina)
- ciklosporin i takrolimus (koriste se za liječenje pojačanog imunološkog odgovora), jer postoji povećani rizik od oštećenja bubrega
- linezolid (koristi se za liječenje bakterijskih infekcija), jer može povisiti krvni tlak.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nurofen Cold and Flu se ne smije uzimati tijekom trudnoće, jer može štetno utjecati na trudnoću i razvoj ploda.

Budući da se lijek u malim količinama izlučuje u majčino mlijeko, Nurofen Cold and Flu se ne smije primjenjivati tijekom dojenja.

Ovaj lijek pripada skupini nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAIL) koji prolazno mogu smanjiti plodnost kod žena. Ova pojava nestaje nakon prestanka uzimanja terapije.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Ako se uzima kako je preporučeno, ovaj lijek мало ili umjereno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Pojedinačna ili kratkotrajna primjena obično ne zahtijeva uvođenje posebnih mjera opreza.

### **Nurofen Cold and Flu sadrži boju Sunset Yellow**

Ovaj lijek sadrži boju *Sunset Yellow* koja može uzrokovati alergijske reakcije.

### **Nurofen Cold and Flu sadrži natrij**

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tabletu, tj. zanemarive količine natrija.

### 3. Kako uzimati Nurofen Cold and Flu

Najnižu učinkovitu dozu potrebno je primjenjivati tijekom najkraćeg razdoblja potrebnog za ublažavanje simptoma. Ako imate infekciju i ako simptomi (kao što su vrućica i bol) ustraju ili se pogoršaju, odmah se obratite liječniku (pogledajte dio 2.).

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

#### Doziranje

##### Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

1 tableta svakih 6 sati, po potrebi.

Za teže simptome, uzmite 2 tablete svakih 6 sati, po potrebi.

Između pojedinačnih doza, ostavite najmanje 4 sata razmaka.

Nemojte nikada premašiti najvišu dnevnu dozu od 6 tableta (što odgovara 1200 mg ibuprofena i 180 mg pseudoefedrinklorida).

#### Primjena u djece

Nurofen Cold and Flu se ne smije primjenjivati kod djece mlađe od 12 godina.

#### Način primjene

Kroz usta.

Tablete treba progutati cijele, s dosta tekućine.

Kako bi se smanjio rizik od pojave probavnih tegoba tijekom primjene ovog lijeka, preporučuje se uzimati tablete s hranom ili nakon obroka.

#### Trajanje primjene

Nurofen Cold and Flu koristi se samo za kratkotrajno ublažavanje simptoma. Ako simptomi traju ili se pogoršaju nakon 4 dana (odrasli)/3 dana (adolescenti), potrebno je konzultirati liječnika.

#### Ako uzmete više Nurofen Cold and Flu tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Nurofen Cold and Flu tableta nego što ste trebali, ili ako su Vaša djeca slučajno uzela lijek, odmah se obratite liječniku ili najbližoj bolnici kako biste dobili mišljenje o riziku i savjet o postupanju.

Simptomi predoziranja ibuprofenom mogu uključivati mučninu, bol u trbuhi, povraćanje (s primjesama krvi), gastrointestinalno krvarenje (pogledajte dio 4 ispod), proljev, glavobolju, zujanje u ušima, smetenost i nekontroliran pokret oka. Također se može pojaviti uznemirenost, izrazita pospanost, dezorientacija ili koma. Povremeno bolesnici razviju konvulzije. Pri visokim dozama zabilježeni su omamlijenost, bol u prsnom košu, osjećaj lutanja srca, gubitak svijesti, konvulzije (uglavnom u djece), slabost i omaglica, krv u mokraći, niske razine kalija u krvi, osjećaj hladnoće po tijelu i problemi s disanjem. Nadalje, protrombinsko vrijeme/INR može biti produženo, vjerojatno zbog interferencije s djelovanjem cirkulirajućih čimbenika zgrušavanja. Mogu se pojaviti akutno zatajenje bubrega i oštećenje jetre. Kod astmatičara može doći do pogoršanja astme. Osim toga, može doći do niskog krvnog tlaka i smanjenog disanja.

Simptomi predoziranja pseudoefedrinom uključuju uznemirenost, razdražljivost, nemir, nevoljno drhtanje, konvulzije, poteškoće s mokrenjem, zadržavanje mokraće, povišeni krvni tlak, osjećaj lutanja srca, ubrzan rad srca, poremećaj srčanog ritma, mučninu i povraćanje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

#### **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave se mogu umanjiti korištenjem najniže učinkovite doze kroz najkraće moguće vrijeme potrebno da bi se ublažili simptomi.

##### **Ozbiljne nuspojave**

Odmah prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu i potražite hitnu liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od znakova koji mogu ukazivati na sljedeće ozbiljne nuspojave:

**Vrlo rijetke** (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

- ozbiljne alergijske reakcije koje uključuju neobjasnjivo piskanje ili kratkoću daha, oticanje lica, jezika ili grla, otežano disanje, ubrzani rad srca i pad krvnog tlaka koji može dovesti do šoka
- ozbiljne kožne reakcije poput osipa po cijelom tijelu, stvaranja mjehurića, ljuštanja ili ljuštenja kože (Stevens-Johnsonov sindrom, eritema multiforme, toksična epidermalna nekroliza)
- poremećaji stvaranja krvnih stanica koji uključuju anemiju, smanjen broj bijelih krvnih stanica (leukopenija), smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija), smanjen broj svih vrsta krvnih stanica (pancitopenija), smanjen broj određenih vrsta bijelih krvnih stanica (agranulocitoza). Prvi simptomi su vrućica, grlobolja, površinske rane u ustima, simptomi slični gripi, teška iscrpljenost, neobjasnjivo krvarenje iz nosa i stvaranje modrica.
- puknuća ili krvarenja iz probavnog sustava, praćena crnom stolicom (melena) i povraćanjem krvi (hematemeza), koja ponekad mogu biti fatalna, posebno kod starijih bolesnika
- ne-bakterijska upala ovojnica mozga (aseptički meningitis). Simptomi mogu uključivati vrućicu, glavobolju, povraćanje, slabost, ukočenost vrata i dezorientiranost.

**Nepoznate** (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- ozbiljni poremećaji koji utječu na krvne žile u mozgu, poznati kao sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES) i sindrom reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije (RCVS)
- bol u prsnom košu što može biti znak potencijalno ozbiljne alergijske reakcije koja se zove Kounisov sindrom
- teška kožna reakcija praćena osipom kože, vrućicom, oticanjem limfnih čvorova i povišenim razinama određene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofila) (sindrom DRESS)

Odmah prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu i potražite hitnu liječničku pomoć ako se pojave simptomi koji bi mogli biti znakovi sindroma posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES) i sindroma reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije (RCVS). Oni uključuju:

- jaku glavobolju koja nastupi iznenada
- mučninu
- povraćanje
- smetenost
- napadaje
- promjene vida.

##### **Ostale nuspojave**

**Manje česte** (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- koprivnjača i svrbež
- glavobolja, nevoljno drhtanje i vrtoglavica
- bol u trbušu, mučnina i probavne tegobe
- različiti osipi po koži

**Rijetke** (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

- proljev, vjetrovi, zatvor i povraćanje

### **Vrlo rijetke** (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

- pad krvnog tlaka ili poremećaj srčanog ritma
- želučani čir, rane u ustima (ulcerozni stomatitis) i upala želučane sluznice (gastritis)
- pogoršanje kroničnih upalnih crijevnih bolesti (kolitisa i Crohnove bolesti)
- poremećaji jetre, posebno kod dugotrajnog liječenja uz karakteristično žutilo kože i bjeloočnica
- bolno i neugodno mokrenje (disurija), akutno zatajenje bubrega
- snižena razina hemoglobina

### **Nepoznate** (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- anoreksija, nesanica, uznemirenost, halucinacije, tjeskoba, nemir
- zatajenje srca, ubrzani rad srca, poremećaj srčanog ritma, osjećaj lutanja srca, otekline (edemi), bol u prsimu
- povišeni krvni tlak
- reaktivnost dišnog sustava što uključuje astmu, pogoršanje astme, suženje donjih dišnih puteva (bronhospazam) ili otežano disanje
- suhoća usta
- prekomjerno znojenje
- zadržavanje mokraće
- mišićna slabost
- razdražljivost, žed
- crveni, ljuskavi, prošireni osip s kvržicama ispod kože i mjehurićima, uglavnom lokaliziran na naborima kože, trupu i gornjim udovima te popraćen vrućicom na početku liječenja (akutna generalizirana egzantematozna pustuloza, AGEP). U slučaju nastanka ovih simptoma, prestanite uzimati Nurofen Cold and Flu i odmah potražite liječničku pomoć (pogledajte dio 2.).
- upala debelog crijeva zbog nedovoljne opskrbe krvlju (ishemijski kolitis)
- oštećenje očnog živca zbog smanjenog protoka krvi (ishemijska optička neuropatija)
- preosjetljivost kože na svjetlost

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Nurofen Cold and Flu**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Nurofen Cold and Flu sadrži**

Djelatne tvari su ibuprofen i pseudoefedrinklorid. Jedna tableta sadrži 200 mg ibuprofena i 30 mg pseudoefedrinklorida.

Pomoćne tvari su: kalcijev fosfat, mikrokristalična celuloza, povidon, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat, hipromeloza, talk, izopropanol, boja *Opaspray Yellow M-l F-6168* ili *Mastercote Yellow FA 0156*, titanijev dioksid (E171), boja *Quinoline Yellow* (E104), boja *Sunset Yellow* (E110), tinta *Opacode S-1-8152 HV Black*, šelak, crni željezov oksid (E172), lecitin soje, *Antifoam DC 1510*, n-butil alkohol.

**Kako Nurofen Cold and Flu izgleda i sadržaj pakiranja**

Žute, filmom obložene tablete s crno otisnutom identifikacijskom oznakom na jednoj strani, promjera 10-11 mm.

Nurofen Cold and Flu je dostupan u pakiranjima od 12 (1x12) ili 24 (2x12) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

**Nositelj odobrenja:**

Reckitt Benckiser d.o.o.,  
Ulica grada Vukovara 269 D,  
10 000 Zagreb

**Proizvođač:**

RB NL Brands B.V.,  
Schiphol Boulevard 207,  
1118 BH Schiphol,  
Nizozemska

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

**Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2025.**