

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Fincar 5 mg filmom obložene tablete

finasterid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Fincar i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Fincar?
3. Kako uzimati Fincar?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Fincar?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Fincar i za što se koristi?

Fincar pripada klasi lijekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze. Djelatna tvar u lijeku Fincar je finasterid, koji djeluje tako što se veže za enzim 5-alfa-reduktazu te tako sprječava stvaranje tvari uključene u rast prostate. Posljedica toga je zaustavljanje daljnog povećanja prostate. Dugotrajno uzimanje lijeka Fincar često smanjuje veličinu prostate.

Zašto Vam je liječnik propisao Fincar?

Finasterid je specifični inhibitor enzima i primjenjuje se u liječenju muškaraca s dobroćudnim povećanjem prostate (benignom hiperplazijom prostate - BHP). Finasterid smanjuje povećanu prostatu i ublažava mokraćne simptome. Finasterid će pomoći smanjiti rizik od razvoja iznenadne nemogućnosti mokrenja (akutne urinarne retencije) i potrebu za operacijom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Fincar?

Nemojte uzimati Fincar

- ako ste alergični na finasterid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Stanje za koje se propisuje Fincar javlja se samo u muškaraca. Žene i djeca ne smiju uzimati Fincar.

Što morate znati prije i tijekom uzimanja lijeka Fincar?

Ako je Vaša spolna partnerica trudna ili bi mogla biti trudna, morate izbjegavati izlagati je Vašem sjemenu koje može sadržavati male količine lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Fincar.

- Ako imate ili ste imali alergijsku reakciju.
- Ako radite PSA test, koji se provodi radi otkrivanja tumora prostate, obavijestite Vašeg liječnika da uzimate Fincar, jer Fincar može utjecati na rezultat PSA testa u krvi.

- Ako bolujete ili ste bolovali od bolesti jetre. Ne preporučuje se primjena lijeka Fincar u bolesnika sa zatajivanjem jetre.

Morate redovito posjećivati Vašeg liječnika radi periodičke kontrole i procjene napretka u liječenju.

Promjene raspoloženja i depresija

U bolesnika liječenih lijekom Fincar prijavljene su promjene raspoloženja kao što su depresivno raspoloženje, depresija i, manje često, misli o samoubojstvu. Ako se pojavi bilo koji od tih simptoma, обратите se Vašem liječniku za savjet što je prije moguće.

Molimo Vas da potražite savjet liječnika ako se nešto od gore navedenog odnosi ili se ikad prije odnosilo na Vas.

Drugi lijekovi i Fincar

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Fincar se općenito može uzimati zajedno s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, обратите se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Fincar je namijenjen isključivo za liječenje dobroćudnog povećanja prostate u muškaraca. Trudnice ili žene koje bi mogle biti trudne ne smiju uzimati Fincar i ne smiju rukovati smravljenim ili slomljenim Fincar tabletama. Ako se djelatna tvar u lijeku Fincar apsorbira nakon uzimanja kroz usta ili preko kože trudnice koja nosi muško dijete, finasterid kojem to dijete može biti izloženo prije rođenja može narušiti normalni razvoj njegovih spolnih organa. Ako trudnica dođe u kontakt s djelatnom tvari u lijeku Fincar, potrebno je potražiti savjet liječnika. Fincar tablete obložene su filmom koji sprječava kontakt s djelatnom tvari tijekom normalnog rukovanja tabletama, pod uvjetom da tablete nisu slomljene ili zdrobljene.

Dojenje

Fincar smiju uzimati samo muškarci.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka koji bi ukazivali na to da Fincar može štetno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Fincar sadrži laktozu, natrij i benzoatnu kiselinu

Ovaj lijek sadrži mlječni šećer - laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, обратите se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po jednoj tabletici, tj. zanemarive količine natrija.

Ovaj lijek sadrži 0,1224 mg natijevog benzoata u jednoj tabletici.

3. Kako uzimati Fincar?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tabletica svaki dan. Može se uzeti uz obrok ili neovisno o njemu.

Liječnik će Vam reći koliko dugo trebate uzimati Fincar. Ne zaboravite da je Vašoj prostatni trebalo mnogo godina da naraste toliko da Vam prouzroči simptome. Fincar može ublažiti simptome koje imate i kontrolirati bolest samo ako ga nastavite uzimati tijekom dugog razdoblja.

Liječnik Vam može propisati Fincar u kombinaciji s drugim lijekom koji se zove doksazosin. To može pridonijeti boljoj kontroli dobroćudnog povećanja prostate.

Ako imate dojam da je učinak lijeka Fincar prejak ili preslab, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više Fincara nego što ste trebali

Uzmete li više Fincar tableta nego li je propisano u ovoj uputi o lijeku ili više nego li Vam je propisao liječnik, odmah se obratite liječniku, službi za hitnu medicinsku pomoć ili ljekarniku. Sa sobom uzmite kutiju s tabletama.

Ako ste zaboravili uzeti Fincar

Uzimajte Fincar kako je propisano. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadiili zaboravljenu tabletu.

Propustite li uzeti tabletu, uzmite je čim se sjetite. Ako je uskoro vrijeme za sljedeću tabletu, nemojte uzeti propuštenu, nego samo uzmite sljedeću tabletu prema uobičajenom rasporedu. Što prije nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Fincar

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka Fincar i odmah se obratite liječniku ako uočite bilo koji od sljedećih simptoma ozbiljne alergijske reakcije (angioedem): oticanje lica, jezika ili grla; otežano gutanje; koprivnjača i otežano disanje.

U bolesnika koji uzimaju Fincar zabilježene su i sljedeće nuspojave s obzirom na učestalost:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- smanjenje spolnog nagona ili smanjena spolna želja
- impotencija (nesposobnost postizanja erekcije)

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- promjene ili tegobe pri izbacivanju sjemena, kao što je smanjena količina sjemena koja se oslobađa kod spolnog odnosa
- oticanje i/ili osjetljivost dojki
- osip

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- alergijske reakcije kao što je oticanje usana, jezika, grla i lica
- depresija
- smanjenje spolnog nagona koje se nastavilo i nakon prestanka uzimanja lijeka
- osjećaj lutanja srca
- povišenje vrijednosti jetrenih enzima
- svrbež, koprivnjača
- bol u testisima
- tegobe pri izbacivanju sjemena koje su se nastavile nakon prestanka uzimanja lijeka
- nemogućnost postizanja erekcije koja se nastavila nakon prestanka uzimanja lijeka
- neplodnost i/ili slaba kakvoća sjemena. Nakon prestanka uzimanja lijeka prijavljen je poboljšanje kakvoće sjemena.
- anksioznost (tjeskoba)

U rijetkim je slučajevima prijavljen rak dojke u muškaraca.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika ako primijetite bilo koje promjene na dojkama, kao što su kvržice, bol, povećanje dojke ili iscijedak iz dojke, jer to mogu biti znakovi ozbiljne bolesti kao što je karcinom dojke kod muškaraca.

Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Fincar?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25 °C, u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fincar sadrži?

- Djetalna tvar je finasterid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg finasterida.
- Pomoćne tvari su: kukuruzni škrob; laktosa hidrat; natrijev škroboglikolat, vrste A; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; smjesu natrijevog dokuzata i natrijevog benzoata; magnezijev stearat; hipromelozu; titanijev dioksid (E171); makrogol 6000; boju indigo carmine (E132).

Kako Fincar izgleda i sadržaj pakiranja?

Fincar 5 mg su svijetlo plave, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete, promjera 7,00-7,30 mm. Kutija sadrži 28 (2×14) filmom obloženih tableta u blister (PVC/PVDC/Al) pakiranju.

Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

PharmaS d.o.o.

Radnička cesta 47

10 000 Zagreb

Proizvođači:

PharmaS d.o.o.

Radnička cesta 47

10 000 Zagreb

Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerp, Belgija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2019.