

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Ramipril Genericon 2,5 mg tablete

Ramipril Genericon 5 mg tablete

Ramipril Genericon 10 mg tablete

ramipril

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek, jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Ramipril Genericon i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ramipril Genericon
3. Kako uzimati Ramipril Genericon
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Ramipril Genericon
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Ramipril Genericon i za što se koristi

Ramipril Genericon sadrži djelatnu tvar ramipril. Pripada skupini lijekova koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima).

Ovaj lijek djeluje tako što:

- u organizmu smanjuje prirodnu proizvodnju tvari koja povisuje krvni tlak;
- opušta i širi krvne žile;
- olakšava srcu da pumpa krv po Vašem tijelu.

Ovaj lijek koristi se za:

- liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija);
- smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara;
- smanjenje rizika ili odgađanje pogoršanja problema s bubrezima (bez obzira imate li dijabetes ili ne);
- liječenje srca koje ne može osigurati dovoljno krvi ostatku tijela (zatajenje srca);
- terapiju nakon srčanog udara (infarkt miokarda), sa srčanim zatajenjem.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ramipril Genericon

Nemojte uzimati Ramipril Genericon

- ako ste alergični na ramipril, bilo koji drugi ACE inhibitor ili bilo koju od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.
Znakovi preosjetljivosti uključuju osip kože, probleme s disanjem i gutanjem, kao i oticanje usana, lica, grla i jezika.
- ako ste ikada prije imali ozbiljnu alergijsku reakciju – takozvani angioedem. Znakovi takve reakcije uključuju svrbež, koprivnjaču (urtikariju), crvene mrlje na rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, probleme s disanjem i gutanjem.

- ako morate ići na dijalizu ili bilo koji drugi oblik filtracije krvi, jer ovisno o korištenom aparatu, ovaj lijek možda nije prikladan za Vas.
- ako bolujete od problema s bubrežima pri čemu je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza bubrežne arterije).
- ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, koji se koristi za liječenje jedne vrste dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih, jer je u tom slučaju povećan rizik od angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat).
- tijekom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).
- ako imate izrazito nizak ili nestabilan krvni tlak. Ovo treba procijeniti Vaš liječnik.
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ne smijete uzimati Ramipril Genericon ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, molimo Vas razgovarajte s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ramipril Genericon:

- ako bolujete od problema sa srcem, jetrom ili bubrežima.
- ako ste izgubili veliku količinu soli ili tekućine iz tijela (zbog povraćanja, proljeva, iznimno jakog znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajno uzimanje diureтика (tablete za mokrenje) ili zbog dijalize).
- ako imate predviđenu terapiju za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzibilizacija).
- ako trebate primiti anestetik zbog operacije ili zahvata na zubima. Možda će biti potrebno prekinuti liječenje ovim lijekom jedan dan prije. Molimo upitajte svog liječnika za savjet.
- ako imate visoku razinu kalija u krvi (vidljivu u rezultatima krvnih pretraga).
- ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti razinu natrija u krvi. Vaš liječnik može provoditi redovite krvne pretrage, osobito za provjeru razine natrija u krvi, naročito ako ste stariji.
- ako uzimate lijekove koji se zovu mTOR inhibitori (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus) ili DPP-IV inhibitori (vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin) ili neprilizin-NEP-inhibitori (npr. racekadotril) jer oni mogu povećati rizik od nastanka angioedema, ozbiljne alergijske reakcije.
- ako bolujete od kolagenske vaskularne bolesti (kolagenoze), npr. skleroderme ili sistemskog eritematoznog lupusa.
- morate obavijestiti svog liječnika ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudnjeti. Ovaj lijek se ne preporučuje u prva tri mjeseca trudnoće, a može ozbiljno našteti Vašem nerođenom djetetu nakon prva tri mjeseca trudnoće (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 - blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 - aliskiren

Ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, rizik od angioedema može biti povećan:

- racekadotril, koji se koristi za liječenje proljeva
- lijekove koji se koriste za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
- vildagliptin, koji se koristi za liječenje šećerne bolesti

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima. Pogledajte također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Ramipril Genericon“.

Djeca i adolescenti

Primjena ovog lijeka ne preporučuje se u djece i adolescenata mlađih od 18 godina, jer sigurnost i djelotvornost primjene u djece nije utvrđena.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), molimo razgovarajte s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Drugi lijekovi i Ramipril Genericon

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ramipril Genericon može utjecati na učinak drugih lijekova, a također i drugi lijekovi mogu utjecati na učinak ovog lijeka.

Molimo obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova, jer oni mogu umanjiti učinak Ramipril Genericona:

- lijekove za ublažavanje boli i upale (npr. nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID) poput ibuprofena, indometacina i acetilsalicilatne kiseline);
- lijekove za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija, npr. efedrin, noradrenalin ili adrenalin. Vaš liječnik Vam treba provjeriti krvni tlak.

Molimo obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova, jer se istovremenom primjenom s Ramipril Genericonom povećava rizik pojave nuspojava:

- lijekove za ublažavanje boli i upale (npr. nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID) poput ibuprofena, indometacina i acetilsalicilatne kiseline);
- temsirolimus i druge lijekove za liječenje raka (kemoterapija);
- lijekove za sprečavanje odbacivanja organa nakon transplantacije, poput ciklosporina, everolimusa, sirolimusa i takrolimusa;
- diuretike (lijekovi za mokrenje) poput furosemida;
- nadomjeske kalija (uključujući nadomjeske soli), diuretike koji štede kalij i druge lijekove koji mogu povećati količinu kalija u krvi (npr. trimetoprim i kotrimoksazol za bakterijske infekcije; ciklosporin, imunosupresijski lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenih organa; i heparin, koji se koristi za razrjeđivanje krvi radi sprječavanja nastanka krvnih ugrušaka)
- steroidne lijekove protiv upale poput prednizolona;
- allopurinol (za smanjenje koncentracije urične kiseline u krvi);
- prokainamid (za liječenje aritmija srca);
- druge lijekove koji mogu sniziti krvni tlak poput nitrata (za liječenje bolesti srca), određene lijekove za liječenje mentalnih poremećaja, baklofen (lijek za liječenje teških bolesti mišića), lijekove za liječenje bolesti prostate (alfuzozin, doksazozin, prazozin, tamsulozin, terazozin);
- vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin (za liječenje šećerne bolesti tipa 2);
- racekadotril (za liječenje proljeva).

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

- ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Ramipril Genericon“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Molimo obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer Ramipril Genericon može utjecati na njihov učinak:

- lijekove za liječenje dijabetesa, poput lijekova za snižavanje koncentracije glukoze u krvi koji se uzimaju kroz usta i inzulina. Ramipril Genericon može sniziti razinu šećera u krvi. Potrebno je redovito provjeravati razinu šećera u krvi za vrijeme liječenja ovim lijekom.
- litij (za liječenje mentalnih bolesti). Ovaj lijek može povisiti razinu litija u krvi. Stoga Vam liječnik mora pažljivo pratiti razinu litija u krvi.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), molimo razgovarajte s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Ramipril Genericon s hranom i pićem

- uzimanje alkohola tijekom liječenja ovim lijekom može izazvati omaglicu i ošamućenost. Ako niste sigurni koja je dozvoljena količina alkohola koju smijete popiti za vrijeme liječenja ovim lijekom, molimo Vas upitajte svog liječnika ili ljekarnika jer lijekovi za snižavanje krvnog tlaka i alkohol mogu međusobno pojačavati učinak.
- ovaj lijek može se uzimati neovisno o jelu (vidjeti dio 3. „Kako uzimati Ramipril Genericon“).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Ne biste trebali uzimati Ramipril Genericon tijekom prvih 12 tjedana trudnoće, a uopće ga ne smijete uzimati nakon 13-tog tjedna trudnoće jer lijek može biti potencijalno štetan za nerođeno dijete.

Molimo odmah obavijestite svog liječnika ako zatrudnите tijekom liječenja ovim lijekom.

Prije planirane trudnoće potrebno je liječenje ovim lijekom zamijeniti prikladnjim lijekom.

Dojenje

Ne biste trebali uzimati Ramipril Genericon ako dojite.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet svog liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme uzimanja Ramipril Genericona možete osjetiti omaglicu. Veća je vjerojatnost da se to dogodi na početku liječenja ovim lijekom ili prilikom povećanja doze. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilima ili koristiti alate i/ili strojeve.

Ramipril Genericon sadrži laktozu (mlječni šećer) i natrij.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tabletu, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Ramipril Genericon

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti?

Liječenje visokog krvnog tlaka

- uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno
- liječnik će Vam prilagoditi dozu, dok se ne postigne kontrola Vašeg krvnog tlaka
- najveća dopuštena doza je 10 mg dnevno
- ako već uzimate diuretike (lijekove za mokrenje), moguće je da će Vam liječnik reći da smanjite dozu diuretika prije početka liječenja ovim lijekom ili da potpuno prestanete uzimati diuretik

Smanjenje rizika srčanog ili moždanog udara

- uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno
- liječnik može kasnije odlučiti da je potrebno povećati dozu
- uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno

Liječenje u svrhu smanjenja ili odgađanja pogoršanja problema s bubrezima

- početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno
- liječnik će Vam naknadno prilagoditi dozu
- uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jednom dnevno

Liječenje zatajenja srca

- uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno
- liječnik će Vam naknadno prilagoditi dozu
- najveća dopuštena doza je 10 mg dnevno, preporučuje se podijeliti dozu u dvije primjene dnevno

Liječenje nakon srčanog udara

- uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno do 2,5 mg dva puta dnevno
- liječnik će Vam prilagoditi dozu
- najveća dopuštena doza je 10 mg dnevno, preporučuje se podijeliti dozu u dvije primjene dnevno

Stariji bolesnici

Vaš liječnik će započeti liječenje s nižom početnom dozom i polagano prilagođavati dozu tijekom liječenja.

Uzimanje lijeka

- Lijek uzmite kroz usta svaki dan u isto vrijeme.
- Tablete progutajte cijele, s dovoljnom količinom tekućine.
- Nemojte žvakati niti drobiti tablete.
- Ovaj lijek može se uzimati uz jelo ili neovisno o jelu.

Ako uzmete više Ramipril Genericona nego što ste trebali

Odmah se javite svom liječniku ili se javite na hitni odjel u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti u bolnicu. Zamolite nekoga da Vas odveze ili pozovite hitnu pomoć. Sa sobom ponesite pakiranje lijeka kako bi liječnik koji Vas primi znao koji lijek ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Ramipril Genericon

- Ako propustite uzeti dozu lijeka, uzmite sljedeću dozu prema rasporedu uzimanja.
- Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite neku od sljedećih nuspojava, odmah prestanite uzimati Ramipril Genericon i обратите se liječniku, jer Vam je možda potrebno hitno liječenje:

- oticanje lica, usana ili grla, koje otežava gutanje ili disanje, kao i svrbež i osip na koži. Ovo mogu biti znakovi teške alergijske reakcije na lijek.
- teške reakcije na koži, uključujući osip na koži, ranice u ustima (ulceracije), pogoršanje postojećih problema s kožom, crvenilo, stvaranje mjehurića na koži ili ljuštenje kože (poput Stevens-Johnsonovog sindroma, toksične epidermalne nekrolize, eritema multiforme).

Odmah obavijestite liječnika ako primijetite nešto od sljedećeg:

- ubrzani rad srca, nepravilno ili snažno kucanje srca (palpitacije), bol ili stezanje u prsnom košu ili ozbiljne probleme kao što su srčani ili moždani udar;
- nedostatak zraka ili kašalj – mogući znakovi problema s plućima;
- lako nastajanje modrica, krvarenja koja traju dulje od uobičajenog, bilo kakvi znakovi krvarenja (npr. krvarenje iz desni), ljubičaste točkice na koži ili povećana podložnost

- infekcijama, grlobolja i vrućica, umor, nesvjestica, omaglica ili bljedilo – mogući znakovi poremećaja krvi ili koštane srži;
- jaki bolovi u trbuhu, koji se mogu širiti prema leđima – mogući znakovi pankreatitisa (upala gušterače);
 - vrućica, zimica, umor, gubitak apetita, bol u trbuhu, mučnina, žutilo kože ili očiju (žutica) – mogući znakovi poremećaja jetre poput hepatitisa (upale jetre) ili oštećenja jetre.

Ostale moguće nuspojave:

Molimo Vas da obavijestite liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od par dana.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika)

- glavobolja ili umor;
- omaglica. Veća je vjerojatnost za pojavu ove nuspojave na početku liječenja ovim lijekom ili prilikom povećanja doze.
- nesvjestica, hipotenzija (iznimno nizak krvni tlak), posebice pri naglom sjedanju ili ustajanju;
- suhi, nadražujući kašalj, upala sinusa (sinusitis) ili bronhitis, nedostatak zraka;
- bol u želucu ili crijevima, proljev, probavne tegobe, mučnina ili povraćanje;
- osip na koži, sa ili bez ispupčenja kože;
- bol u prsnom košu;
- grčevi ili bol u mišićima;
- povišena koncentracija kalija u krvi (vidljiva krvnim pretragama).

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika)

- problemi s ravnotežom (vrtočavica);
- svrbež i neuobičajeni osjećaji na koži poput utrnutosti, trnaca, bockanja, žarenja ili mravinjanja (parestezija);
- gubitak ili promjene osjeta okusa;
- poremećaji spavanja;
- depresivno raspoloženje, tjeskoba, neuobičajena nervosa ili nemir;
- začepljen nos, otežano disanje ili pogoršanje astme;
- oticanje u probavnem sustavu, takozvani intestinalni angioedem sa simptomima poput boli u trbuhu, povraćanja i proljeva;
- žgaravica, zatvor ili suha usta;
- pojačano lučenje urina (diureza) tijekom dana;
- pojačano znojenje;
- smanjenje ili gubitak apetita (anoreksija);
- ubrzani ili nepravilni otkucaji srca;
- oticanje ruku i nogu - mogući znak da Vaše tijelo zadržava više vode nego je uobičajeno;
- crvenilo kože uz osjećaj vrućine;
- zamagljen vid;
- bol u zglobovima;
- vrućica;
- seksualni poremećaji kod muškaraca, smanjeni libido kod muškaraca i žena;
- povećani broj određenih bijelih krvnih stanica (eozinofilija) uočen tijekom provođenja krvnih pretraga;
- krvni nalazi koji ukazuju na promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 bolesnika)

- osjećaj nesigurnosti ili zbumjenosti;
- crven i otečen jezik;
- teško ljuštenje ili guljenje kože, kožni osip praćen svrbežom i kvrgama;
- problemi s noktima (npr. klimavost nokta ili odvajanje nokta iz ležišta na nozi ili ruci);
- kožni osip ili pojava modrica na koži;
- pojava točkica na koži i hladnoća u udovima;
- crvene, natečene oči koje svrbe ili suze;
- poremećaj sluha ili zvonjenje u ušima;

- osjećaj slabosti;
- krvne pretrage pokazuju smanjeni broj crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica, trombocita ili smanjenu koncentraciju hemoglobina.

Vrlo rijetko (javlja se kod manje od 1 od 10000 bolesnika)

- povećana osjetljivost na sunčevu svjetlost (fotoosjetljivost).

Ostale moguće nuspojave:

Molimo Vas da obavijestite liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od par dana.

- teškoće u koncentraciji;
- natečena usta;
- krvne pretrage pokazuju premali broj krvnih stanica;
- krvne pretrage pokazuju manju razinu natrija u krvi od uobičajene;
- prsti na rukama ili nogama mijenjaju boju kada Vam je hladno, uz prisutan osjećaj trnaca ili boli kod zagrijavanja (Raynaudov sindrom);
- povećanje grudi u muškaraca;
- usporena ili narušena sposobnost reakcije;
- osjećaj vrućine;
- promijenjen osjet njuha;
- iznenadno zatajenje jetre;
- gubitak kose; pogoršanje psorijaze;
- koncentrirani urin (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja ADH-a (antidiuretskog hormona). Ako imate navedene simptome, obratite se svom liječniku što je prije moguće.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ramipril Genericon

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Lijek čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ramipril Genericon sadrži

Djelatna tvar je ramipril.

Jedna Ramipril Genericon 2,5 mg tableta sadrži 2,5 mg ramiprla.

Jedna Ramipril Genericon 5 mg tableta sadrži 5 mg ramiprla.

Jedna Ramipril Genericon 10 mg tableta sadrži 10 mg ramiprla.

Drugi sastojci su:

Ramipril Genericon 2,5 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne tvari: natrijev hidrogenkarbonat; laktosa hidrat; karmelozanatrij, umrežena; škrob, prethodno geliran; natrijev stearilfumarat; željezov oksid, žuti (E172).

Ramipril Genericon 5 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne tvari: natrijev hidrogenkarbonat; laktosa hidrat; karmelozanatrij, umrežena; škrob, prethodno geliran; natrijev stearilfumarat; željezov oksid, crveni (E172); željezov oksid, žuti (E172).

Ramipril Genericon 10 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne tvari: natrijev hidrogenkarbonat; laktosa hidrat; karmelozanatrij, umrežena; škrob, prethodno geliran; natrijev stearilfumarat.

Kako Ramipril Genericon izgleda i sadržaj pakiranja

Tablete Ramipril Genericona proizvode se u tri jačine: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg.

Ramipril Genericon 2,5 mg tablete su žute, ovalne s urezom i utisnutim „R“/„2“, dimenzija 10,0 mm x 5,0 mm.

Ramipril Genericon 5 mg tablete su ružičaste, ovalne s urezom i utisnutim „R“/„3“, dimenzija 8,8 mm x 4,4 mm.

Ramipril Genericon 10 mg tablete su bijele do gotovo bijele, ovalne s urezom i utisnutim „R“/„4“, dimenzija 11,0 mm x 5,5 mm.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Tablete se nalaze u kutiji s 30 tableta (3x10) i 90 tableta (9x10) u blister pakiranju (OPA/Al/PVC//Al).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, 8054 Graz
Austrija

Proizvođač

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, 8054 Graz
Austrija

Balkanpharma Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shose Str.
Dupnitsa 2600
Bugarska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Genericon Pharma d.o.o.

Nova Ves 17
10 000 Zagreb
Tel: 01/4669322

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2022.