

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata tiotropij

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Spiriva Respimat i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Spirivu Respimat
3. Kako uzimati Spirivu Respimat
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Spirivu Respimat
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Spiriva Respimat i za što se koristi

Spiriva Respimat pomaže bolesnicima s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB) ili astmom kako bi lakše disali. KOPB je kronična bolest pluća koja dovodi do nedostatka zraka i kašljanja. Naziv KOPB je vezan uz stanja kroničnog bronhitisa i emfizema. Astma je kronična bolest karakterizirana upalom i sužavanjem dišnih puteva.

S obzirom da su KOPB i astma kronične bolesti, potrebno je svakodnevno uzimati Spirivu Respimat, a ne samo kada imate probleme s disanjem ili druge simptome KOPB-a ili astme. Kada se primjenjuje u liječenju astme, Spiriva Respimat se uzima kao dodatak drugim inhalacijskim lijekovima za liječenje astme, od kojih se najčešće koristi takozvani inhalacijski kortikosteroid i dugodjelujući β_2 agonisti.

Spiriva Respimat je bronhodilatator dugog djelovanja koji vam pomaže u otvaranju dišnih puteva te na taj način olakšava protok zraka u pluća i iz pluća. Redovita primjena Spirive Respimate može vam također pomoći i kod pojave nedostatka zraka povezanog s ovom bolešću te u smanjivanju učinaka bolesti na svakodnevni život. Svakodnevna primjena Spirive Respimat također će vam pomoći u sprečavanju iznenadnog, kratkotrajnog pogoršanja simptoma KOPB-a koje može trajati nekoliko dana.

Za ispravno doziranje Spirive Respimat, molimo, vidjeti dio 3. "Kako uzimati Spirivu Respimat" i upute kako koristiti Respimat inhalator za višekratnu primjenu koje su navedene na kraju Upute o lijeku.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Spirivu Respimat

Nemojte uzimati Spirivu Respimat

- ako ste alergični na tiotropij ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični na atropin ili izvedene spojeve, npr. ipratropij ili oksitropij

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Spirivu Respimat.

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako patite od glaukoma zatvorenog kuta, problema s prostatom ili imate problem s protočnošću urina.

Ako patite od problema s bubrežima, molimo posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Kada primjenjujete Spirivu Respimat, pazite da sprej nikako ne dođe u doticaj s očima. Ovo može rezultirati osjećajem boli ili nelagode u očima, zamućenim vidom, nastankom svjetlosnih kolobara ili živopisnih slika s crvenilom očiju (tj. glaukom zatvorenog kuta). Očni simptomi mogu biti popraćeni glavoboljom, mučninom ili povraćanjem. Operite oči u toploj vodi, prekinite primjenu tiotropijevog bromida i odmah se obratite liječniku za daljnji savjet.

Ako se vaše disanje pogorša ili se pojavi osip, oticanje ili svrbež odmah nakon primjene inhalatora, prekinite s primjenom i odmah obavijestite svog liječnika.

Suhoća usta koja je primijećena uz antikolinergičko liječenje može, pri dugotrajnoj primjeni, za posljedicu imati stvaranje zubnog karijesa. Stoga, molimo, obratite pažnju na oralnu higijenu.

Spiriva Respimat se koristi za održavanje bronhodilatacije kod kronične opstruktivne plućne bolesti ili astme. Ne uzimate ovaj lijek u liječenju iznenadnog napadaja nedostatka zraka ili piskanja u plućima. Za to Vam je liječnik trebao propisati drugi inhalacijski lijek („medikacija za akutne napadaje“). Molimo, slijedite upute svog liječnika.

Ako Vam je za astmu propisan Spiriva Respimat, on mora biti dodatak, u najmanju ruku, inhalacijskim steroidima i β_2 agonistima dugog djelovanja. Nastavite s uzimanjem inhalacijskih steroida kako Vam je propisao liječnik, čak i ako se osjećate bolje.

U slučaju da ste doživjeli infarkt miokarda tijekom posljednjih 6 mjeseci ili neku vrstu nestabilnog ili po život opasnog nepravilnog otkucavanja srca ili teško zatajenje srca u protekloj godini, molimo, obavijestite svog liječnika. Ovo je važno radi odluke je li Spiriva ispravan lijek za Vas.

Nemojte primjenjivati Spirivu Respimat više od jedanput dnevno.

Također se morate obratiti svom liječniku ako imate osjećaj da se Vaše disanje pogoršava.

Ako imate cističnu fibrozu, obavijestite svog liječnika jer Spiriva Respimat može pogoršati simptome cistične fibroze.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena Spirive Respimat u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Spiriva Respimat

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Osobito, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali antikolinergike, kao što su ipratropij ili oksitropij.

Nisu zabilježene nuspojave zbog interakcija kada se Spiriva Respimat uzimala zajedno s drugim lijekovima za liječenje KOPB-a i astme, kao što su inhalacijski lijekovi za

ublažavanje simptoma (npr. salbutamol), metilksantini (npr. teofilin), antihistaminici, mukolitici (npr. ambroksol), modifikatori leukotriena (montelukast), kromoni, anti-IgE liječenje (npr. omalizumab) i/ili inhalacijski ili oralni steroidi (npr. prednizolon, budenozid).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Ne smijete primjenjivati ovaj lijek, osim ako Vam ga Vaš liječnik nije posebno propisao.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Pojava omaglice ili zamućenog vida može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Spiriva Respimat sadrži benzalkonijev klorid

Ovaj lijek sadrži 0,0011 mg benzalkonijevog klorida u svakom potisku

Benzalkonijev klorid može uzrokovati piskanje i poteškoće s disanjem (bronhospazam), naročito ako imate astmu.

3. Kako uzimati Spirivu Respimat

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Spiriva Respimat namijenjena je isključivo za inhaliranje.

Preporučena doza za bolesnike u dobi 6 i više godina je:

Spiriva Respimat je učinkovita tijekom 24 sata te se stoga uzima samo **JEDANPUT DNEVNO**, ako je moguće u isto vrijeme svakog dana. Svaki put kada je upotrebljavate, primijenite DVA POTISKA.

S obzirom da su KOPB i astma dugotrajne bolesti, uzmite Spirivu Respimat svaki dan, a ne samo kada imate probleme s disanjem. Nemojte uzeti više od preporučene doze.

Primjena u djece i adolescenata

Spiriva Respimat se ne preporučuje za primjenu u djece i mlađe od 6 godina zbog nedostatka podataka o sigurnosti i djelotvornosti.

Budite sigurni da znate kako ispravno primjenjivati Respimat inhalator za višekratnu primjenu. Upute kako uzimati Respimat inhalator za višekratnu primjenu nalaze se na kraju ove upute, vidjeti „Kako koristiti Respimat inhalator za višekratnu primjenu“.

Ako uzimate više Spirive Respimat nego što ste trebali

Ako uzmete više od dva potiska Spirive Respimata u jednom danu, odmah se obratite svom liječniku. Možete biti pod povećanim rizikom od nastanka nuspojava kao što su suhoća usta, zatvor, teškoće s mokrenjem, ubrzani otkucaji srca ili zamućen vid.

Ako ste zaboravili uzeti Spirivu Respimat

Ako zaboravite uzeti dozu (DVA POTISKA JEDANPUT DNEVNO), uzmite je čim se sjetite, ali ne uzimajte dvije doze u isto vrijeme ili istog dana. Nakon toga sljedeću dozu uzmite drugi dan u uobičajeno vrijeme, kako je propisano.

Ako prestanete uzimati Spirivu Respimat

Prije prekida uzimanja Spirive Respimat, morate se obratiti svom liječniku ili ljekarniku. Ako prekinete uzimati Spirivu Respimat, znakovi i simptomi KOPB-a i astme mogu se pogoršati.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Trenutne alergijske reakcije, kao što su osip, koprivnjača (urtikarija), oticanje usta i lica ili iznenadni problemi s disanjem (angioneurotski edem) ili druge reakcije preosjetljivosti (kao što su naglo sniženje krvnog tlaka ili omaglica) se mogu pojaviti pojedinačno ili kao dio teške alergijske reakcije (anafilaktičke reakcije) nakon primjene Spiriva Respimata.

Nadalje, općenito kao kod svih inhalacijskih lijekova, pojedini bolesnici mogu osjetiti neočekivano stezanje u prsima, kašalj, piskanje ili nedostatak zraka odmah nakon inhalacije (bronhospazam).

Ukoliko primijetite neku od gore navedenih nuspojava, odmah se obratite liječniku.

Ocjena nuspojava se zasniva na sljedećim učestalostima:

Često:	mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba
Manje često:	mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba
Rijetko:	mogu se javiti u manje od 1 na 1 000 osoba
Nepoznato:	učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

U nastavku opisane nuspojave su imale osobe koje su primjenjivale ovaj lijek, a navedene su prema učestalosti ili kao česte, manje česte, rijetke, ili s nepoznatom učestalošću.

Nuspojava	Učestalost KOPB	Učestalost Astma
Suhoća usta	Često	Manje često
Omaglica	Manje često	Manje često
Glavobolja	Manje često	Manje često
Problemi sa spavanjem (nesanica)	Rijetko	Manje često
Napravilni otkucaji srca (fibrilacija atrijske, supraventrikularna tahikardija)	Rijetko	Nepoznato
Osjećaj lupanja srca (palpitacije)	Rijetko	Manje često
Ubrzano lupanje srca (tahikardija)	Rijetko	Nepoznato
Kašalj	Manje često	Manje često
Krvarenje iz nosa (epistaksa)	Rijetko	Nepoznato
Upala grla (faringitis)	Manje često	Manje često
Promuklost (disfonija)	Manje često	Manje često
Stezanje u prsima, povezano s kašljem, piskanjem ili nedostatkom zraka odmah nakon inhalacije (bronhospazam)	Rijetko	Manje često
Zatvor (konstipacija)	Manje često	Rijetko
Gljivične infekcije usne šupljine i grla	Manje često	Manje često

Nuspojava	Učestalost KOPB	Učestalost Astma
(orofaringealna kandidijaza)		
Otežano gutanje (disfagija)	Rijetko	Nepoznato
Osip	Manje često	Manje često
Svrbež (pruritus)	Manje često	Rijetko
Otežano mokrenje (zadržavanje urina)	Manje često	Nepoznato
Bolno mokrenje (disurija)	Manje često	Nepoznato
Nastanak vidnih kolobara oko svjetla ili živopisnih slika s crvenilom očiju (glaukom)	Rijetko	Nepoznato
Porast izmjerenog očnog tlaka	Rijetko	Nepoznato
Zamućeni vid	Rijetko	Nepoznato
Upala grkljana (laringitis)	Rijetko	Nepoznato
Žgaravica (gastroezofagealna refluksna bolest)	Rijetko	Nepoznato
Zubni karijes	Rijetko	Nepoznato
Upala desni (gingivitis)	Rijetko	Rijetko
Krvarenje iz nosa (epistaksa)	Rijetko	Rijetko
Upala jezika (glositis)	Rijetko	Nepoznato
Upala usta (stomatitis)	Nepoznato	Rijetko
Ozbiljna alergijska reakcija koja izaziva otečenost usta i lica ili grla (angioneurotski edem)	Rijetko	Rijetko
Koprivnjača (urtikarija)	Rijetko	Rijetko
Infekcije ili ulceracije kože	Rijetko	Nepoznato
Suhoća kože	Rijetko	Nepoznato
Infekcije mokraćnog sustava	Rijetko	Rijetko
Preosjetljivost, uključujući trenutne reakcije	Nepoznato	Rijetko
Gubitak tjelesne tekućine (dehidracija)	Nepoznato	Nepoznato
Upala sinusa (sinusitis)	Nepoznato	Nepoznato
Začepljenje crijeva ili odsustvo pokretljivosti crijeva (opstrukcija crijeva, uključujući paralitički ileus)	Nepoznato	Nepoznato
Mučnina	Nepoznato	Nepoznato
Teška alergijska reakcija (anafilaktička reakcija)	Nepoznato	Nepoznato
Otečenost zglobova	Nepoznato	Nepoznato

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavljivu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Spirivu Respimat

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i naljepnici uloška, iza oznake „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Iako nije potrošen sav lijek, Spiriva Respimat se mora baciti najkasnije 3 mjeseca nakon prvog otvaranja (vidjeti Upute za uporabu u nastavku).

Ne zamrzavati.

Rok valjanosti u primjeni

Promijeniti uložak najkasnije 3 mjeseca nakon umetanja

Nemojte koristiti Respimat inhalator za višekratnu primjenu dulje od jedne godine.

Preporučena primjena: 6 uložaka po inhalatoru

Napomena: Funkcioniranje RESPIMAT inhalatora za višekratnu primjenu je dokazano ispitivanjima kod 540 pokretanja (što odgovara količini od 9 uložaka).

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Spiriva Respimat sadrži

Djelatna tvar je tiotropij. Jedna inhalacijska doza sadržava 2,5 mikrograma tiotropija (u obliku tiotropijevog bromid hidrata) po potisku (2 potiska sadrže jednu terapijsku dozu).

Inhalacijska doza je doza koja je dostupna bolesniku nakon prolaza kroz nastavak za usta.

Pomoćne tvari su:

benzalkonijev klorid, dinatrijev edetat, pročišćena voda i kloridna kiselina 3,6 % za prilagodbu pH.

Kako Spiriva Respimat izgleda i sadržaj pakiranja

Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata je bistra, bezbojna otopina inhalata.

Spiriva Respimat 2,5 mikrograma se sastoji od jednog uložka s otopinom inhalata i jednog Respimat inhalatora. Uložak se umeće u inhalator prije prve uporabe.

1 uložak sadrži 4 ml otopine inhalata.

Jednostruko pakiranje: 1 Respimat inhalator za višekratnu primjenu i 1 uložak, dostatan za 60 potisaka (30 terapijskih doza).

Trostruko pakiranje: 1 Respimat inhalator za višekratnu primjenu i 3 uložka, dostatana za 60 potisaka (30 terapijskih doza).

Pakiranje s jednostrukim punjenjem: 1 uložak, dostatan za 60 potisaka (30 terapijskih doza)

Pakiranje s trostrukim punjenjem: 3 uložka, dostatna za 60 potisaka (30 terapijskih doza) svaki

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 75, Zagreb
Republika Hrvatska

Proizvođač:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Njemačka

Boehringer Ingelheim España, SA
c/ Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Španjolska

Boehringer Ingelheim France
100-104 Avenue de France
75013 Pariz
Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2024.


Upute za korištenje Respimat višekratnog inhalatora

Respimat je inhalator koji stvara sprej za inhalaciju. Respimat je samo za vas. Jedan uložak daje više doza. Respimat višekratni inhalator omogućuje zamjenu uložka, a može se koristiti sa do 6 uložaka.

Djeca moraju upotrebljavati Spiriva Respimat uz asistenciju odrasle osobe.

Pročitajte sljedeće Upute prije nego počnete koristiti Spiriva Respimat.

Ovaj inhalator se koristi samo JEDANPUT DNEVNO. Prilikom svakog korištenja, primijenite DVA POTISKA.



- Ako se Spiriva Respimat ne koristi dulje od 7 dana, ispustite jedan potisak prema tlu.
- Ako se Spiriva Respimat ne koristi dulje od 21 dan, ponovite korake 4 do 6 navedene pod ‘Priprema za primjenu’, dok se ne vidi oblak. Zatim ponovite korake 4 do 6 još tri puta.

Kako održavati svoj Respimat za višekratnu primjenu

Čistite nastavak za usta, uključujući metalni dio unutar nastavka za usta samo s navlaženom krpicom ili maramicom, najmanje jedanput tjedno.

Manje blijeđenje na nastavku za usta ne utječe na učinak Respimat inhalatora za višekratnu primjenu. Prema potrebi, očistite navlaženom krpicom vanjski dio Respimat inhalatora za višekratnu primjenu.

Kada zamijeniti inhalator


Nakon što ste potrošili inhalator sa 6 uložaka, nabavite novo pakovanje Spiriva Respimata, koje sadrži inhalator. Ne koristite Respimat inhalator za višekratnu primjenu dulje od godinu dana nakon umetanja prvog uložka



Priprema za primjenu

1. Uklonite prozirnu bazu • Kapica mora biti zatvorena. • Pritisnite sigurnosnu hvataljku, dok povlačite prozirnu bazu s drugom rukom.	
2. Umetnite uložak • Umetnite uložak u inhalator. • Položite inhalator na čvrstu površinu te čvrsto stišćite dok ne sjedne na mjesto.	
3. Pratite broj uložaka i vratite prozirnu bazu • Označite prazni kružić na naljepnici inhalatora kako bi pratili broj uložaka • Vratite prozirnu bazu na njezino mjesto, tako da čujete škljocaj.	

		
4. Okrećite • Kapica mora biti zatvorena. • Okrećite prozirnu bazu u smjeru strelica na naljepnici, dok ne začujete škljocaj (pola okretaja).		
5. Otvorite • Otvorite kapicu tako da bude potpuno otvorena.		
6. Pritisnite • Usmjerite inhalator prema podu. • Pritisnite gumb za ispuštanje doze. • Zatvorite kapicu. • Ponavljajte korake 4 – 6, dok ne vidite oblak. • Nakon što vidite oblak, ponovite korake 4 - 6 još tri puta. Vaš inhalator sada je spreman za uporabu i moće će ispustiti 60 potisaka (30 doza).		



Svakodnevna primjena

OKREĆITE • Kapica mora biti zatvorena. • OKREĆITE prozirnu bazu u smjeru strelica na naljepnici, dok ne čujete škljocaj (pola okretaja).	
OTVORITE • OTVORITE kapicu tako da bude potpuno otvorena.	
PRITISNITE • Izdahnite polagano i u potpunosti. • Obuhvatite ustima kraj nastavka za usta bez pokrivanja ventila za zrak.	

Usmjerite inhalator prema stražnjem dijelu grla.

- Dok polagano, duboko udišete kroz usta, **PRITISNITE** gumb za ispuštanje doze te nastavite udisati polagano, dok ne osjetite nelagodu.
- Zadržite dah na 10 sekundi ili koliko dugo možete.
- Ponovite faze **OKREĆITE, OTVORITE, PRITISNITE** za ukupno dva potiska.
- Zatvorite kapicu do sljedeće uporabe inhalatora.



Kada zamjeniti Spiriva Respimat uložak

Indikator doze pokazuje koliko je potisaka ostalo u uložku.



60 potisaka preostalo.



Manje od 10 potisaka preostalo. Nabavite novi uložak.



Uložak je potrošen. Okrenite prozirnu bazu kako bi ju olabavili. Inhalator je sada u zaključanoj poziciji. Izvadite uložak iz inhalatora. Umetnite novi uložak dok ne škljocne (korak 2). Novi uložak će viriti van više od prvog uložka (nastavite s korakom 3). Ne zaboravite vratiti prozirnu bazu kako biste otključali inhalator.

Odgovori na česta pitanja

Teško je dovoljno duboko umetnuti uložak.

Jeste li slučajno okrenuli prozirnu bazu prije nego ste umetnuli uložak? Otvorite kapicu, pritisnite gumb za ispuštanje doze, zatim umetnite uložak.

Zamjenjujete li uložak? Novi uložak će viriti van više od prvog korištenog uloška. Umetnite ga dok ne škljocne, a zatim zamijenite prozirnu bazu.

Ne mogu pritisnuti gumb za ispuštanje doze.

Jeste li vratili prozirnu bazu? Ako niste, vratite prozirnu bazu kako biste otključali inhalator.

Respimat inhalator za višekratnu primjenu funkcionira samo s prozirnomo bazom na mjestu.

Jeste li okrenuli prozirnu bazu? Ako niste, okrećite prozrnu bazu u jednom pokretu, dok ne začujete škljocaj (pola okretaja).

Pokazuje li indikator doze na Vašem ulošku bijelu strelicu na crvenoj pozadini? Vaš uložak se potrošio. Umetnite novi uložak i vratite prozirnu bazu.

Teško je ukloniti ispražnjeni uložak.

Istovremeno povucite i okrenite uložak.

Ne mogu okrenuti ili vratiti prozirnu bazu natrag.

Da li je prozirna baza labava, a indikator doze na Vašem ulošku prikazuje bijelu strelicu na crvenoj pozadini? Vaš uložak se potrošio. Umetnite novi uložak.

Jeste li već okrenuli prozirnu bazu?

Ako je prozirna baza već okrenuta, slijedite korake “OTVORITE” i “PRITISNITE” u dijelu “Svakodnevna primjena” kako biste oslobodili lijek.

Moj Respimat se prebrzo troši.

Jeste li koristili Respimat prema uputama (dva potiska/jedanput dnevno)? Svaki uložak će trajati 30 dana ako se primjenjuje u obliku dva potiska jedanput dnevno.

Jeste li često ispuštali sprej u zrak kako biste provjerili djeluje li Spiriva Respimat? Kada jednom pripremite Spiriva Respimat za primjenu, više nije potrebno ispuštati sprej ukoliko se svakodnevno primjenjuje.

Jeste li više puta skinuli i vratili prozirnu bazu? Nemojte uklanjati prozirnu bazu prije nego što se uložak potroši. Svaki put kada skinete prozirnu bazu bez zamjene uložaka, brojač doza bilježi jedno udisanje, a preostale doze se smanjuju.

Moj Spiriva Respimat ne ispušta sprej.

Jeste li umetnuli uložak? Ako niste, umetnite uložak. Nakon što ste sastavili svoj Spiriva Respimat, ne uklanjajte prozirnu bazu ili uložak dok se uložak ne potroši.

Jeste li ponovili faze OKREĆITE, OTVORITE, PRITISNITE manje od tri puta nakon umetanja uloška? Ponovite faze OKREĆITE, OTVORITE, PRITISNITE tri puta nakon umetanja uloška, kako je pokazano u koracima 4 do 6 pod “Priprema za prvu primjenu”.

Da li indikator doze na Vašem ulošku prikazuje bijelu strelicu na crvenoj pozadini? Vaš uložak se potrošio. Umetnite novi uložak.

Moj Spiriva Respimat automatski ispušta sprej.

Je li kapica bila otvorena kada ste okretali prozirnu bazu? Zatvorite kapicu, zatim okrenite prozirnu bazu.

Jeste li pritisnuli gumb za ispuštanje doze kada ste okretali prozirnu bazu? Zatvorite kapicu tako da gumb za ispuštanje doze bude pokriven, zatim okrenite prozirnu bazu.

Jeste li prestali okretati prozirnu bazu prije nego ste začuli škljocaj? Okrećite prozirnu bazu u jednom pokretu dok ne začujete škljocaj (pola okretaja). Brojač doza će brojati svaki nepotpuni okret, a broj ili preostale doze se smanjuju.

Je li kapica bila otvorena kada ste zamijenili uložak? Zatvorite kapicu, zatim zamijenite uložak.